

Мультипродукт Для Детей



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки шипучие** светло-оранжевого цвета, круглые, плоские, с запахом апельсина.

	1 таб.
ретинол (вит. А)	400 мкг
токоферол (вит. Е)	5 мг
аскорбиновая кислота (вит. С)	30 мг
тиамин (вит. В ₁)	700 мкг
рибофлавин (вит. В ₂)	800 мкг
кальция пантотенат (вит. В ₅)	3 мг
пиридоксин (вит. В ₆)	1 мг
цианокобаламин (вит. В ₁₂)	0.5 мкг
фолиевая кислота	100 мкг
никотинамид (вит. РР)	9 мг
биотин (вит. Н)	75 мкг
кальций	120 мг
магний	15 мг
йод	75 мкг
железо	500 мкг
медь	100 мкг
цинк	1 мг
марганец	100 мкг

10 шт. - пеналы полипропиленовые.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Сбалансированный комплекс витаминов и минералов, необходимых для роста и правильного развития детского организма.

Показания к применению:

Применяется для профилактики и лечения гиповитаминозов и дефицита минеральных веществ у детей с 3 лет при состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах и минералах:

— острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания;

- период реконвалесценции;
- повышенные физические и умственные нагрузки;
- неполноценное и несбалансированное питание;
- периоды интенсивного роста и развития.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Реконвалесценция](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- тяжелая почечная недостаточность;
- гиперкальциемия;
- гемохроматоз.

Способ применения и дозы:

Внутрь, предварительно растворив таблетку в стакане воды. **Детям в возрасте от 3 до 5 лет** - по 1 таб./сут. **Детям в возрасте от 5 до 10 лет** - по 1-2 таб./сут. **Детям в возрасте старше 10 лет** - по 2 таб./сут.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница.

Передозировка:

Не известна.

Лечение: промывание желудка и симптоматическая терапия

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Колестирамин снижает всасывание всех жирорастворимых витаминов.

Неомицин препятствует всасыванию витамина А.

Витамин В₅ уменьшает активность леводопы.

Всасывание витамина В₁₂ уменьшается при одновременном приеме с колхицином, неомицином и гипогликемическими препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан при тяжелой почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте от 3 до 5 лет по 1 таб./сут. **Детям в возрасте от 5 до 10 лет** по 1-2 таб./сут. **Детям в возрасте старше 10 лет** по 2 таб./сут.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при комнатной температуре. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности - 3 года

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Multiprodukt_dlya_detey