Мяты перечной листья

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Мяты перечной листья

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сырье растительное измельченное***	**1 пачка**
листья мяты перечной	100 %

30 г - пакеты (1) - пачки картонные.
35 г - пакеты (1) - пачки картонные.
50 г - пакеты (1) - пачки картонные.
75 г - пакеты (1) - пачки картонные.
100 г - пакеты (1) - пачки картонные.

◊ ***Сырье растительное - порошок***	**1 фильтр-пакет**
листья мяты перечной	1.5 г

Фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Настой листьев мяты перечной обладает спазмолитическим, успокаивающим, желчегонным, противорвотным и местнораздражающим действием.

Показания к применению:

— симптоматическая терапия: спазмы гладкой мускулатуры ЖКТ, тошнота, рвота.

Относится к болезням:

- Спазмы
- Тошнота

Противопоказания:

— ранний детский возраст (до 3-х лет);

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

5 г (1 столовая ложка) листьев мяты перечной помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой н нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь 2-3 раза/сут за 15 мин до еды: **дети от 3 до 6 лет** по 1 десертной ложке, **дети от 7 до 14 лет** - по 1-2 столовые ложки, **дети старше 14 лет и взрослые** - по 1/2-1/3 стакана.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировок не зарегистрировано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходима консультация лечащего врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не изучено.

Особые указания и меры предосторожности:

При сохранении симптомов на фоне заболевания на фоне приема лекарственного препарата необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Прием препарата не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и др. транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 3 лет.

Принимают внутрь 2-3 раза/сут за 15 мин до еды: **дети от 3 до 6 лет** по 1 десертной ложке, **дети от 7 до 14 лет** - по 1-2 столовые ложки, **дети старше 14 лет** - по 1/2-1/3 стакана.

Условия хранения:

Хранить препарат в сухом, защищенном от света месте. Приготовленное водное извлечение - в темном прохладном месте не более 2-х сут. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять но истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Myaty_perechnoy_listya