

Нафтадерм



Код АТХ:

- [D08AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нафталанская нефть](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Линимент** коричневого цвета, со слабым своеобразным запахом.

Нафталанская нефть рафинированная	100 г
	10 г

Вспомогательные вещества: воск эмульсионный, этанол 95% (спирт этиловый), вода очищенная - до 100 г.

10 г - тубы (1) - пачки картонные.
15 г - тубы (1) - пачки картонные.
20 г - тубы (1) - пачки картонные.
35 г - тубы (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает противовоспалительным, противозудным, дезинфицирующим и стимулирующим заживление эффектом.

Показания к применению:

- псориаз;
- экзема;
- нейродермит;

- себорея;
- розовый лишай;
- фурункулы;
- сикоз;
- пиодермия;
- чесука;
- раны;
- пролежни;
- плохо заживающие язвы;
- рожистое воспаление.

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Лишай](#)
- [Нейродермит](#)
- [Пролежни](#)
- [Псориаз](#)
- [Раны](#)
- [Себорея](#)
- [Фурункул](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам нефти нафталанской;
- почечная недостаточность;
- геморрагический синдром;
- выраженная анемия.

Способ применения и дозы:

Нафтадерм наносят тонким слоем, не втирая, на пораженные участки кожи 2 раза в день. Курс лечения индивидуален и может составлять 3-4 недели.

Для применения препарата у **детей** необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочное действие:

Редко, даже при длительном применении могут наблюдаться фолликулиты, сухость кожи. При появлении сухости кожу необходимо дополнительно смазывать смягчающими кремами или сделать перерыв в лечении на 2-3 дня.

Передозировка:

Не выявлена.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применять только после консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Лекарственные препараты из нафталанской нефти повышают проницаемость кожи для других лекарственных веществ.

При нарушениях функции почек

Препарат противопоказан при почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Для применения препарата у детей необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 4° до 8°C. Замораживания не допускать. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Naftaderm>