Нафтадерм



Код АТХ:

- D08AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Нафталанская нефть

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Линимент*** коричневого цвета, со слабым своеобразным запахом.

	100 г
нафтланская нефть рафинированная	10 г

Вспомогательные вещества: воск эмульсионный, этанол 95% (спирт этиловый), вода очищенная - до 100 г.

10 г - тубы (1) - пачки картонные.
15 г - тубы (1) - пачки картонные.
20 г - тубы (1) - пачки картонные.
35 г - тубы (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает противовоспалительным, противозудным, дезинфицирующим и стимулирующим заживление эффектом.

Показания к применению:

— псориаз;

— экзема;

— нейродермит;

— себорея;

— розовый лишай;

— фурункулы;

— сикоз;

— пиодермия;

— почесуха;

— раны;

— пролежни;

— плохо заживающие язвы;

— рожистое воспаление.

Относится к болезням:

- Воспаление
- Лишай
- Нейродермит
- Пролежни
- Псориаз
- Раны
- Себорея
- Фурункул
- Экзема

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам нефти нафталанской;

— почечная недостаточность;

— геморрагический синдром;

— выраженная анемия.

Способ применения и дозы:

Нафтадерм наносят тонким слоем, не втирая, на пораженные участки кожи 2 раза в день. Курс лечения индивидуален и может составлять 3-4 недели.

Для применения препарата у **детей** необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочное действие:

Редко, даже при длительном применении могут наблюдаться фолликулиты, сухость кожи. При появлении сухости кожу необходимо дополнительно смазывать смягчающими кремами или сделать перерыв в лечении на 2-3 дня.

Передозировка:

Не выявлена.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применять только после консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявленно.

Особые указания и меры предосторожности:

Лекарственные препараты из нафталанской нефти повышают проницаемость кожи для других лекарственных веществ.

При нарушениях функции почек

Препарат противопоказан при почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Для применения препарата у детей необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 4° до 8°С. Замораживания не допускать. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Naftaderm