

## Нафтизин



### **Код АТХ:**

- [R01AA08](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Нафазолин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Вегетотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Альфа-адреномиметик. При нанесении на слизистые оболочки оказывает быстрое, выраженное и продолжительное сосудосуживающее действие.

### **Показания к применению:**

Острый ринит, сенной насморк, острый и хронический ларингит, острый евстахиит, аллергический и связанный с облучением отек гортани, гиперемия слизистых оболочек после операций в верхних дыхательных путях, хронические конъюнктивиты, астенопические расстройства, как дополнительное средство - при конъюнктивитах бактериального происхождения, при лечении уrolитиаза, в комбинации с местными анестетиками (при противопоказаниях для применения адреналина).

### **Относится к болезням:**

- [Аллергия](#)
- [Астения](#)
- [Астенопия](#)
- [Гиперемия слизистых оболочек](#)
- [Евстахиит](#)
- [Конъюнктивит](#)

- [Ларингит](#)
- [Насморк](#)
- [Отек гортани](#)
- [Ринит](#)
- [Сенной насморк](#)
- [Уролителиаз](#)

### **Противопоказания:**

Детский возраст до 1 года, артериальная гипертензия, гипертиреозидизм, повышенная чувствительность к нафазолину, выраженный атеросклероз, хронический ринит, тяжелые заболевания глаз, сахарный диабет; одновременный прием ингибиторов MAO и период до 14 дней после окончания их применения.

### **Способ применения и дозы:**

Индивидуальный, в зависимости и показаний, применяемой лекарственной формы.

### **Побочное действие:**

*Местные реакции:* раздражение слизистой оболочки (в зависимости от места применения); при применении более 1 недели - отек слизистой оболочки, атрофический ринит.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* реактивная гиперемия, тахикардия, повышение АД.

*Со стороны ЦНС:* головная боль.

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение нафазолина при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только по строгим показаниям в тех случаях, когда ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск развития побочных эффектов у плода или ребенка.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не следует применять одновременно с ингибиторами MAO или в течение 14 дней после окончания их применения.

Нафазолин замедляет всасывание местноанестезирующих средств (удлиняет их действие при проведении поверхностной анестезии).

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Нафазолин может оказывать резорбтивное действие.

При длительном применении выраженность сосудосуживающего действия постепенно снижается (явление тахифилаксии), в связи с чем рекомендуется через 5-7 дней применения сделать перерыв на несколько дней.

#### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан в детском возрасте до 1 года.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Naftizin>