

Нафтизин



Код АТХ:

- [R01AA08](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нафазолин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Альфа-адреномиметик. При нанесении на слизистые оболочки оказывает быстрое, выраженное и продолжительное сосудосуживающее действие.

Показания к применению:

Острый ринит, сенной насморк, острый и хронический ларингит, острый евстахиит, аллергический и связанный с облучением отек гортани, гиперемия слизистых оболочек после операций в верхних дыхательных путях, хронические конъюнктивиты, астенопические расстройства, как дополнительное средство - при конъюнктивитах бактериального происхождения, при лечении уrolитиаза, в комбинации с местными анестетиками (при противопоказаниях для применения адреналина).

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Астения](#)
- [Астенопия](#)
- [Гиперемия слизистых оболочек](#)
- [Евстахиит](#)
- [Конъюнктивит](#)

- [Ларингит](#)
- [Насморк](#)
- [Отек гортани](#)
- [Ринит](#)
- [Сенной насморк](#)
- [Уролителиаз](#)

Противопоказания:

Детский возраст до 1 года, артериальная гипертензия, гипертиреозидизм, повышенная чувствительность к нафазолину, выраженный атеросклероз, хронический ринит, тяжелые заболевания глаз, сахарный диабет; одновременный прием ингибиторов MAO и период до 14 дней после окончания их применения.

Способ применения и дозы:

Индивидуальный, в зависимости и показаний, применяемой лекарственной формы.

Побочное действие:

Местные реакции: раздражение слизистой оболочки (в зависимости от места применения); при применении более 1 недели - отек слизистой оболочки, атрофический ринит.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: реактивная гиперемия, тахикардия, повышение АД.

Со стороны ЦНС: головная боль.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение нафазолина при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только по строгим показаниям в тех случаях, когда ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск развития побочных эффектов у плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует применять одновременно с ингибиторами MAO или в течение 14 дней после окончания их применения.

Нафазолин замедляет всасывание местноанестезирующих средств (удлиняет их действие при проведении поверхностной анестезии).

Особые указания и меры предосторожности:

Нафазолин может оказывать резорбтивное действие.

При длительном применении выраженность сосудосуживающего действия постепенно снижается (явление тахифилаксии), в связи с чем рекомендуется через 5-7 дней применения сделать перерыв на несколько дней.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 1 года.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Naftizin>