Нафтодерил



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Крем для наружного применения*** белого или почти белого цвета, однородный, со слабым характерным запахом.

	100 г
нафтифина гидрохлорид	1 г

Вспомогательные вещества: цетостеариловый спирт - 8 г, изопропилмиристат - 8 г, полисорбат 60 - 6.1 г, цетилпальмитат - 2 г, сорбитана стеарат - 1.9 г, бензиловый спирт - 1 г, натрия гидроксид - 0.12 г, вода очищенная - до 100 г.

15 г - тубы (1) - пачки картонные.
15 г - тубы (2) - пачки картонные.
15 г - тубы (3) - пачки картонные.
30 г - тубы (1) - пачки картонные.
30 г - тубы (2) - пачки картонные.
30 г - тубы (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковое средство, относится к аллиламинам. Механизм действия связан с ингибированием биосинтеза эргостерола, что приводит к нарушению синтеза клеточной стенки возбудителя. Оказывает фунгицидное действие на дерматофиты, плесневые грибы, возбудителей споротрихоза. На дрожжевые грибы действует фунгицидно или фунгистатически в зависимости от конкретного штамма. Обладает противомикробной активностью в отношении различных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые часто сочетаются с грибами. Оказывает противовоспалительное действие, уменьшает зуд. Характеризуется пролонгированным действием (до 24 ч).

Показания к применению:

Онихомикозы, отрубевидный лишай, эпидермофитии крупных кожных складок и стоп, рубромикоз, трихофития, микроспория, кандидозы кожи, микозы со вторичной бактериальной инфекцией.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Лишай
- Микоз
- Отрубевидный лишай
- Эпидермофития

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к нафтифину.

Способ применения и дозы:

Диагнозы

- Атопический дерматит
- Бородавки
- Витилиго
- Выпадение волос

Побочное действие:

В *отдельных случаях:* в месте нанесения сухость и покраснение кожи, чувство жжения.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности в рекомендованных дозах не оказывает неблагоприятного действия на плод.

Источник: http://drugs.thead.ru/Naftoderil