# Наксоджин




## Код АТХ:

- P01AB06

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Ниморазол

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Противопротозойное средство, производное 5-нитроимидазола. Механизм действия связан с нарушением структуры ДНК чувствительных микроорганизмов.

Ниморазол активен в отношении Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, грамотрицательных анаэробных бактерий, в т.ч. Bacteroides fragilis.

***Фармакокинетика***

Обладает высокой степенью абсорбции. Хорошо проникает в различные органы и ткани, биологические жидкости. В высоких концентрациях обнаруживается в вагинальном секрете. Минимальная трихомонацидная концентрация - 0.3-3 мкг/мл. Прием 1.5 г (каждые 12 ч 5 раз подряд) создает через 3 ч после первого приема концентрацию в крови, превышающую минимальную трихомонацидную более чем в 5 раз (16 мкг/мл), через 25 ч – более чем в 9 раз (28 мкг/мл), и через 12 ч после последнего приема – более чем в 2.5 раза (7.5 мкг/мл). При приеме 1 г через каждые 12 ч 3 раза подряд концентрации в вагинальном секрете через 24, 48 и 72 ч составляют 129 мкг/г, 95 мкг/г и 4 мкг/г, соответственно. Метаболизируется в печени с образованием активных метаболитов. Выводится почками (в

неизмененном виде и в виде метаболитов). Концентрация в моче достигает трихомонацидной.

## Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к ниморазолу микроорганизмами.

## Противопоказания:

Заболевания ЦНС, острые неврологические заболевания, беременность, почечная/печеночная недостаточность, период лактации, детский возраст, повышенная чувствительность к производным нитроимидазола.

## Способ применения и дозы:

Внутрь - по 500 мг 2 раза/сут в течение 6 дней или по 2 г 1 раз/сут в течение 1-2 дней.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, изжога, рвота, гастралгия, нарушение функции печени.

*Со стороны ЦНС и периферической нервной системы:* головокружение, сонливость, полиневропатия, парестезии, обострение психических заболеваний.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Ниморазол противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Этанол увеличивает вероятность развития побочных эффектов.

## Особые указания и меры предосторожности:

Рекомендуется одновременное лечение половых партнеров, даже при отсутствии симптомов заболевания у одного из них. В период лечения нельзя употреблять этанол. После окончания лечения при бактериологическом выздоровлении клинические симптомы воспаления могут сохраняться несколько дней.

***При нарушениях функции почек***

Противопоказан при почечной недостаточности.

***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при печеночной недостаточности.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в детском возрасте.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Naksodzhin