

## Налтрексон ФВ



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- Налтрексон

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр МНН](#) [Википедия МНН](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)[англ](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Конкурентный антагонист опиоидных рецепторов. Устраняет центральное и периферическое действие опиоидов, в том числе эндогенных эндорфинов. Действует более интенсивно и длительно, чем налоксон.

#### **Фармакокинетика**

После приема внутрь наркотик практически полностью абсорбируется из ЖКТ.  $C_{max}$  наркотикона и его активного метаболита 6-β-наркотексола в плазме крови достигается через 1 ч.

При длительном применении наркотик не кумулирует в организме, в то время как концентрация 6-β-наркотексола в плазме достигает 40%. Это объясняется тем, что  $T_{1/2}$  метаболита больше, чем у наркотикона.

95% дозы наркотикона биотрансформируется в печени в фармакологически активные метаболиты, главный из которых - 6-бета-наркотексол также является антагонистом опиоидов. Второй метаболит - 2-гидрокси-3-метокси-6-β-наркотексол. Наркотик и его метаболиты подвергаются внутрипеченочной рециркуляции.

Наркотик и его метаболиты выводятся, в основном, почками. Количество свободного наркотикона, который выводится с мочой, составляет менее 1%, а количество свободного и связанного 6-β-наркотексола составляет примерно 38%. Средний  $T_{1/2}$  наркотикона - 4 ч, 6-β-наркотексола - 13 ч.

### **Показания к применению:**

В качестве вспомогательного средства при абстиненции после отмены опиоидных анальгетиков.

**Противопоказания:**

Острый гепатит, печеночная недостаточность.

**Способ применения и дозы:**

Принимают внутрь. Разовая доза составляет 25-50 мг. Схема и длительность лечения устанавливаются индивидуально.

**Побочное действие:**

Со стороны ЦНС: возбуждение, состояние прострации, раздражительность, головокружение; редко - депрессия, паранойя, чувство усталости, спутанность сознания, дезориентация во времени и пространстве, галлюцинации, кошмарные сновидения, сонливость, понижение остроты зрения, боль и чувство жжения в глазах, светобоязнь, боль и ощущение заложенности в ушах, шум в ушах.

Со стороны пищеварительной системы: снижение аппетита, диарея, запор; редко - сухость во рту, метеоризм, усугубление симптомов геморроя, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, повышение активности печеночных трансаминаз.

Со стороны мочевыделительной системы: редко - учащение или нарушение мочеиспускания.

Со стороны половой системы: замедленная эякуляция, уменьшение половой потенции; редко - повышение или понижение либido.

Дermatologические реакции: сыпь; редко - повышение секреции сальных желез, эпидермофития стоп, изменения кожи, соответствующие 1-й стадии отморожения.

Со стороны дыхательной системы: редко - гиперемия сосудов носовой полости, носовое кровотечение, ринорея, чиханье, сухость в горле, повышенное слезоотделение, синусит, затрудненное дыхание, трахеофония, кашель, одышка.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко - флебит, отеки, повышение АД, неспецифические изменения кардиограммы, тахикардия, чувство жара в конечностях, ощущение внезапного прилива крови к лицу.

Прочие: возможно чувство озноба; редко - повышение или потеря аппетита, увеличение массы тела, патологическая зевота, лихорадка, боль в паховой области, увеличение лимфатических узлов, лимфоцитоз; описан один случай идиопатической тромбоцитопенической пурпурсы у больного, который, по-видимому, был сенсибилизирован к налтрексону в ходе предыдущего лечения.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Безопасность применения налтрексона при беременности и в период лактации не установлена.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении с налтрексоном снижается эффективность агонистов опиоидных рецепторов (противокашлевых средств, анальгетиков).

**Особые указания и меры предосторожности:**

Налтрексон можно применять только в случаях, когда пациент не принимает опиоидные анальгетики по крайней мере 7-10 дней.

Налтрексон может быть эффективен при лечении хронического алкоголизма.

С осторожностью применяют у пациентов с нарушениями функции печени и/или почек. В период лечения рекомендуется регулярный контроль функции печени.

Налтрексон следует отменить не менее чем за 48 ч до хирургического вмешательства, при котором потребуется применение опиоидных анальгетиков.

Необходимо иметь в виду, что при применении наркозона вероятность полного восстановления от опиоидной зависимости вариабельна.

***При нарушениях функции почек***

С осторожностью применяют у пациентов с нарушениями функции почек.

***При нарушениях функции печени***

Противопоказан при остром гепатите, печеночной недостаточности.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Naltrekson\\_FV](http://drugs.thead.ru/Naltrekson_FV)