

Натальсид



Код АТХ:

- [B02BC](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Натрия альгинат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Суппозитории ректальные** светло-серого цвета с кремоватым оттенком, торпедообразной формы.

Натрия альгинат	1 супп. 250 мг
-----------------	--------------------------

Вспомогательные вещества: жир твердый (витепсол, суппосир) - достаточное количество до получения суппозитория массой 2.25 г.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гемостатический препарат для местного применения. Активное вещество - альгинат натрия - природный полисахарид, получаемый из бурых морских водорослей. Оказывает выраженное гемостатическое действие, обладает противовоспалительными и репаративными свойствами.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Натальсид не предоставлены.

Показания к применению:

— хронические трещины заднего прохода в стадии эпителизации;

- хронический кровотокающий геморрой;
- проктосигмоидит;
- воспаления прямой кишки в послеоперационном периоде.

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Проктит](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 14 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует применять ректально. Суппозиторий вводят в прямую кишку после самопроизвольного опорожнения кишечника или очистительной клизмы, предварительно смочив его водой.

Взрослым и детям старше 14 лет назначают по 1 суппозиторию 2 раза/сут. Длительность курса лечения составляет 7-14 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Натальсид не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат Натальсид не противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Натальсид не описано.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Натальсид

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: <http://drugs.thead.ru/Natalsid>