

Натальсид (свечи)



Код АТХ:

- [B02BC](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Натрия альгинат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Суппозитории ректальные, 250 мг. В контурной ячейковой упаковке 5 шт., 2 контурные ячейковые упаковки в картонной пачке.

Состав:

Суппозитории ректальные	1 супп.
активное вещество:	
натрия альгинат	250 мг
основа для суппозиторий: жир твердый (витепсол, суппосир) — достаточное количество до получения суппозитория массой 2,25 г	

Описание:

Суппозитории светло-серого цвета с кремоватым оттенком, торпедообразной формы.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, репаративное, гемостатическое.

Фармакодинамика

Активное вещество препарата — натрия альгинат — природный полисахарид, получаемый из бурых морских водорослей. Оказывает выраженное гемостатическое, противовоспалительное и репаративное действие.

Показания к применению:

- хронические трещины заднего прохода в стадии эпителизации;
- хронический кровоточащий геморрой;
- проктосигмоидит;
- воспаления прямой кишки в послеоперационном периоде.

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Геморрой](#)
- [Проктит](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 14 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует применять ректально. Суппозиторий вводят в прямую кишку после самопроизвольного опорожнения кишечника или очистительной клизмы, предварительно смочив его водой.

Взрослым и детям старше 14 лет назначают по 1 суппозиторию 2 раза/сут. Длительность курса лечения составляет 7-14 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Натальсид не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат Натальсид не противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Натальсид не описано.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Natalsid_svechi