Натамицин

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Натамицин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Суппозитории вагинальные*** от светло-желтого до светло-коричневого цвета, торпедообразные; на продольном разрезе должны отсутствовать посторонние включения; допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

	1 супп.
натамицин (в пересчете на 100% вещество)	100 мг

Вспомогательные вещества: макрогола глицерилгидроксистеарат - 75 мг, кремния диоксид коллоидный - 20 мг, жир твердый (Суппоцир АМ) - до 1500 мг.

3 шт. - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Механизм действия

Натамицин - противогрибковый полиеновый антибиотик из группы макролидов, имеющий широкий спектр действия. Оказывает фунгицидное действие. Связывается со стеролами клеточных мембран, нарушая их целостность и функции, что приводит к гибели микроорганизмов.

Активен в отношении большинства патогенных дрожжеподобных грибов (особенно Candida albicans), дрожжей (Torulopsis и Rhodotorula), а также других патогенных грибов (Aspergillus, Penicillium). Менее активен в отношении дерматофитов (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton).

Чувствительность in vitro

Не влияет in vitro на грамположительные и грамотрицательные бактерии.

Резистентность

Резистентность к натамицину в клинической практике не встречается.

Фармакокинетика

Натамицин не оказывает системного действия, т.к. практически не всасывается через неповрежденную кожу и интактные слизистые оболочки.

Показания к применению:

— вагиниты, вульвиты, вульвовагиниты, вызванные грибами рода Candida.

Относится к болезням:

- Вагинит
- Вульвит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Способ введения - для вагинального применения.

Суппозитории, предварительно освободив от контурной упаковки, вводят во влагалище, находясь в положении лежа, как можно глубже 1 раз/сут на ночь.

Дозирование

При кандидозных вагинитах, вульвитах. вульвовагинитах: интравагинально по одному суппозиторию в течение 3-6 дней.

Продолжительность курса лечения устанавливают индивидуально. После исчезновения симптомов заболевания рекомендуется продолжать лечение еще несколько дней. На время менструации применение суппозиториев прерывают.

При упорном течении вагинитов, вызванных Candida albicans, дополнительно назначают натамицин в виде таблеток для приема внутрь: по 1 таблетке 4 раза/сут в течение 10-20 дней для санации очага кандидозной инфекции в кишечнике.

Побочное действие:

При местном применении возможно легкое раздражение и ощущение жжения в месте введения.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата у беременных и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Натамицин с другими лекарственными препаратами не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

При вагинальной аппликации под действием температуры тела суппозитории превращаются в пенистую массу, что способствует равномерному распределению натамицина по слизистой оболочке влагалища.

В период лечения нет необходимости в исключении половых контактов, однако рекомендуется провести обследование половых партнеров и. в случае выявления кандидозного поражения, провести курс лечения натамицином. В период лечения следует использовать барьерные методы контрацепции.

Меры предосторожности при применении

Особых мер предосторожности при применении препарата Натамицин не требуется.

Влияние на способность, управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата Натамицин не влияет па способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Не использовать после истечения срока годности, укачанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Natamicin