

Натрия нуклеинат (порошок)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

[Натрия нуклеинат \(порошок\)](#)



Код АТХ:

- [L03AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Натрия нуклеинат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	1 фл.
Натрия нуклеинат	500 мг

500 мг - Флаконы объемом 10 мл (50) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Натрия нуклеинат выделяют из хлебопекарских дрожжей. Натрия нуклеинат обладает активностью поликлонального иммуностимулятора, регулируя миграцию Т-лимфоцитов и процессы кооперации Т- и В-лимфоцитов, усиливает фагоцитарную активность макрофагов и продукцию факторов неспецифической защиты. Обладает широким спектром биологической активности. Ускоряет процессы регенерации тканей, стимулирует деятельность костного мозга и лейкопоз.

Показания к применению:

В комплексной терапии инфекционных заболеваний, протекающих на фоне вторичных иммунодефицитных состояний:

- хронические неспецифические заболевания легких;
- хронические рецидивирующие вирусные и бактериальные инфекции;

Натрия нуклеинат (порошок)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

— вторичные иммунодефицитные состояния, связанные со старением;

— коррекция лейкопении и агранулоцитоза.

Относится к болезням:

- [Агранулоцитоз](#)
- [Аденоиды \(гипертрофия глоточной миндалины\)](#)
- [Инфекции](#)
- [Лейкоз](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— беременность, период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды. **Взрослым:** суточная доза - 1-2 г в 3-4 приема. Курс лечения - 10 дней (в зависимости от тяжести заболевания - до 6 недель).

Проведение курса терапии препаратом (в том числе для лечения хронических заболеваний) возможно 2-3 раза в течение года.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Не применяют у детей

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Натрия нуклеинат (порошок)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Natriya_Nukleinat_poroshok