

Натрия нуклеинат



Код АТХ:

- [L03AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Натрия нуклеинат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	1 таб.
натрия нуклеинат	250 мг

Вспомогательные вещества: кальция стеарат, крахмал картофельный, поливинилпирролидон низкомолекулярный, сахар-рафинад, аэросил, воск пчелиный, титана диоксид, желатин пищевой, магния карбонат основной, масло подсолнечное, парафин, тальк.

50 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностимуляторы](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Натрия нуклеинат выделяют из хлебопекарских дрожжей. Натрия нуклеинат обладает активностью поликлонального иммуностимулятора, регулируя миграцию Т-лимфоцитов и процессы кооперации Т- и В-лимфоцитов, усиливает фагоцитарную активность макрофагов и продукцию факторов неспецифической защиты. Обладает широким спектром биологической активности. Ускоряет процессы регенерации тканей, стимулирует деятельность костного мозга и лейкопоэз.

Показания к применению:

Применяют у взрослых в комплексной терапии инфекционных заболеваний, протекающих на фоне вторичных иммунодефицитных состояний:

— хронические неспецифические заболевания легких;

- хронические рецидивирующие вирусные и бактериальные инфекции;
- вторичные иммунодефицитные состояния;
- связанные со старением;
- коррекция лейкопении и агранулоцитоза.

Относится к болезням:

- [Агранулоцитоз](#)
- [Аденоиды \(гипертрофия глоточной миндалины\)](#)
- [Инфекции](#)
- [Лейкоз](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- беременность;
- период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды. Суточная доза - 1-2 г в 3-4 приема. Курс лечения - 10 дней (в зависимости от тяжести заболевания - до 6 недель).

Пациентам **пожилого и старческого возраста** с *пониженным иммунным статусом* - по 1-1,5 г/сут в течение 2-3 недель 2 раза в год (весной и осенью).

При *лейкопении* **взрослым** - по 1 таблетке 2-3 раза в сутки, курс лечения определяется индивидуально, в среднем составляет 10 дней.

Проведение курса терапии препаратом (в том числе для лечения хронических заболеваний) возможно 2-3 раза в течение года.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в пожилом возрасте

Пациентам пожилого и старческого возраста с *пониженным иммунным статусом* - по 1-1,5 г/сут в течение 2-3 недель 2 раза в год (весной и осенью)

Применение в детском возрасте

Натрия нуклеинат

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применяется у взрослых.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Natriya_nukleinat