

## Натуркарсевт



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Относится к группе гепатопротекторов. Препятствует разрушению клеточных мембран, что обусловлено способностью ингибировать перекисное окисление липидов. Стимулирует синтез белка и фосфолипидов в поврежденных гепатоцитах, в результате этого происходит стабилизация клеточных мембран, предотвращается потеря компонентов клетки. Препятствует проникновению в клетку некоторых гепатотоксических веществ (в частности, ядов гриба бледной поганки).

#### **Фармакокинетика**

При приеме внутрь абсорбция из ЖКТ низкая и медленная (период полувыведения - 2.2 ч), метаболизируется в печени путем конъюгации,  $T_{1/2}$  - 6 ч. Выводится преимущественно с желчью в форме глюкуронидов и сульфатов. Не кумулирует в организме. После многократного приема внутрь по 140 мг 3 раза/сут достигается стабильное содержание выделения с желчью. Имеет место энтеропеченочная циркуляция.

### **Показания к применению:**

Токсические повреждения печени, хронический гепатит, цирроз печени (в составе комплексной терапии).

### **Относится к болезням:**

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Цирроз печени](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к силибинину.

### **Способ применения и дозы:**

Устанавливают индивидуально. Взрослым назначают по 70-140 мг 2-3 раза/сут, детям - по 30-100 мг 3 раза/сут.

**Побочное действие:**

Редко: послабляющее действие, аллергические реакции.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности и в период лактации препарат назначают только по строгим показаниям и после тщательной оценки соотношения польза/риска.

**Особые указания и меры предосторожности:**

**Применение в детском возрасте**

Применение возможно согласно режиму дозирования.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Naturkarsevt>