

[Наятокс](#)



Код АТХ:

- [M02AX10](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает местнораздражающее и обезболивающее действие.

Раздражение чувствительных рецепторов кожи и всасывание высокоактивных веществ (гистамин, ферменты, органические кислоты и т.д.) способствуют расширению сосудов, улучшению трофики подлежащих тканей и определяет болеутоляющее действие препарата.

Показания к применению:

Болевой синдром при заболеваниях опорно-двигательного аппарата:

- артриты различной этиологии;
- невралгия;
- миалгия;
- ишиас;

— радикулит.

Относится к болезням:

- [Артрит](#)
- [Артроз](#)
- [Ишиас](#)
- [Миалгия](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Радикулит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- активный туберкулез легких;
- лихорадка;
- истощение;
- недостаточность мозгового и коронарного кровообращения;
- ангиоспазм (в т.ч. в анамнезе);
- тяжелая почечная и/или печеночная недостаточность;
- беременность;
- период лактации;
- заболевания кожи и механическое повреждение кожных покровов в местах нанесения мази.

С осторожностью: детский возраст.

Способ применения и дозы:

Наружно. Наносить на кожу болезненных участков по 5-10 г (1-2 ч.ложки) по частям, втирая в кожу, 1 раз/сут. При сильном болевом синдроме - 2 раза/сут до исчезновения болевого синдрома.

Курс лечения без консультации с врачом не должен превышать 10 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожная сыпь, покраснение, зуд.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует тщательно мыть руки после применения мази, чтобы избежать попадания мази в глаза и на другие слизистые оболочки. Избегать попадания мази на открытые раны и слизистые оболочки. В случае неосторожного попадания мази на слизистую оболочку глаз, их необходимо обильно промыть водой.

При нарушениях функции почек

Противопоказание — тяжелая почечная недостаточность.

Наятокс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

При нарушениях функции печени

Противопоказание — тяжелая печеночная недостаточность.

Применение в детском возрасте

С *осторожностью*: детский возраст.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Nayatoks>