Наятокс



Код АТХ:

- M02AX10

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает местнораздражающее и обезболивающее действие.

Раздражение чувствительных рецепторов кожи и всасывание высокоактивных веществ (гистамин, ферменты, органические кислоты и т.д.) способствуют расширению сосудов, улучшению трофики подлежащих тканей и определяет болеутоляющее действие препарата.

Показания к применению:

Болевой синдром при заболеваниях опорно-двигательного аппарата:

— артриты различной этиологии;

— невралгия;

— миалгия;

— ишиас;

— радикулит.

Относится к болезням:

- Артрит
- Артроз
- Ишиас
- Миалгия
- Невралгия
- Неврит
- Радикулит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— активный туберкулез легких;

— лихорадка;

— истощение;

— недостаточность мозгового и коронарного кровообращения;

— ангиоспазм (в т.ч. в анамнезе);

— тяжелая почечная и/или печеночная недостаточность;

— беременность;

— период лактации;

— заболевания кожи и механическое повреждение кожных покровов в местах нанесения мази.

С *осторожностью:* детский возраст.

Способ применения и дозы:

Наружно. Наносить на кожу болезненных участков по 5-10 г (1-2 ч.ложки) по частям, втирая в кожу, 1 раз/сут. При сильном болевом синдроме - 2 раза/сут до исчезновения болевого синдрома.

Курс лечения без консультации с врачом не должен превышать 10 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожная сыпь, покраснение, зуд.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует тщательно мыть руки после применения мази, чтобы избежать попадания мази в глаза и на другие слизистые оболочки. Избегать попадания мази на открытые раны и слизистые оболочки. В случае неосторожного попадания мази на слизистую оболочку глаз, их необходимо обильно промыть водой.

При нарушениях функции почек

Противопоказание — тяжелая почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

Противопоказание — тяжелая печеночная недостаточность.

Применение в детском возрасте

С *осторожностью:* детский возраст.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Nayatoks