Називин Сенситив



Код АТХ:

• R01AA05

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Оксиметазолин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр^{МНН} Википедия^{МНН} РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com^{англ}

Форма выпуска:

 \Diamond Спрей назальный дозированный в виде прозрачного или почти прозрачного раствора от почти бесцветного до слабо-желтого цвета.

	1 доза	1	мл
оксиметазолина гидрохлорид	11.25 мкг	25	0 мкг
		07.40	170.00

Вспомогательные вещества: лимонной кислоты моногидрат - 27.40 мкг, натрия цитрата дигидрат - 172.03 мкг, глицерол 85% - 1121.44 мкг, вода очищенная - 44027.86 мкг.

10 мл (не менее 190 доз) - флаконы полиэтиленовые с дозирующим устройством (1) - пачки картонные.

 \Diamond Спрей назальный дозированный в виде прозрачного или почти прозрачного раствора от почти бесцветного до слабо-желтого цвета.

order memory approximation					
	1 доза	1 мл			
оксиметазолина гидрохлорид	22.5 мкг	500 мкг			

Вспомогательные вещества: лимонной кислоты моногидрат - 27.40 мкг, натрия цитрата дигидрат - 172.03 мкг, глицерол 85% - 1121.44 мкг, вода очищенная - 44016.6 мкг.

10 мл (не менее 190 доз) - флаконы полиэтиленовые с дозирующим устройством (1) - пачки картонные.

 \Diamond **Капли назальные 0.01%** в виде прозрачного или почти прозрачного раствора от почти бесцветного до слабо желтого цвета.

1 мл		

Називин Сенситив

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

оксиметазолина гидрохлорид

100 мкг

Вспомогательные вещества: лимонной кислоты моногидрат - 0.609 мг, натрия цитрата дигидрат - 3.823 мг, глицерол 85% - 24.921 мг, вода очищенная - 978.547 мг.

5 мл - флаконы полиэтиленовые с дозирующим устройством (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Вегетотропные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Сосудосуживающий препарат для местного применения. При нанесении на воспаленную слизистую оболочку полости носа уменьшает ее отечность и выделения из носа. Восстанавливает носовое дыхание. Устранение отека слизистой оболочки полости носа способствует восстановлению аэрации придаточных пазух полости носа, полости среднего уха, что уменьшает вероятность возникновения бактериальных осложнений (гайморита, синусита, среднего отита). При местном интраназальном применении в терапевтических концентрациях не раздражает и не вызывает гиперемию слизистой оболочки полости носа.

При местном интраназальном применении оксиметазолин не обладает системным действием.

Оксиметазолин начинает действовать быстро, в течение нескольких минут. Продолжительность действия препарата Називин Сенситив - до 12 ч.

Фармакокинетика

 $T_{1/2}$ оксиметазолина при его интраназальном введении составляет 35 ч. Выведение с мочой составляет 2.1%, с калом около 1.1%.

Показания к применению:

- простудные заболевания или вирусные инфекции верхних дыхательных путей, сопровождающиеся насморком;
- ринит любой этиологии;
- синусит;
- евстахиит;
- средний отит;
- для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.

Относится к болезням:

- Евстахиит
- Инфекции
- Насморк
- Отит
- Ринит
- Синусит

Противопоказания:

- атрофический ринит;
- закрытоугольная глаукома;
- детский возраст до 1 года (для препарата Називин Сенситив спрей назальный дозированный $11.25~{
 m mkr/дозa}$);
- детский возраст до 6 лет (для препарата Називин Сенситив спрей назальный дозированный 22.5 мкг/доза);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью следует применять препарат при повышенном внутриглазном давлении, хронической сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, стенокардии, аритмии, хронической почечной недостаточности, у пациентов с гиперплазией предстательной железы с клиническими симптомами (задержка мочи), выраженном атеросклерозе, при гипертиреозе, сахарном диабете, феохромоцитоме, а также у пациентов, получавших ингибиторы МАО в течение предшествующих 2 недель и в течение 2 недель после их отмены, трициклические антидепрессанты, бромокриптин.

Способ применения и дозы:

Применяют интраназально.

Капли назальные

Називин Сенситив капли назальные 0.01% предназначены для применения в нос детям в возрасте до 1 года.

Детям в возрасте до 4 недель назначают по 1 капле Називин Сенситив в каждую ноздрю 2-3 раза/сут. С **5-й недели жизни и до 1 года** назначают по 1-2 капли в каждую ноздрю 2-3 раза/сут.

1 капля Називин Сенситив 0.01% содержит 2.8 мкг оксиметазолина гидрохлорида.

Перед применением флакон следует перевернуть. Препарат следует закапывать, запрокинув голову ребенка.

Доказана эффективность также и следующей процедуры: в зависимости от возраста 1-2 капли Називин Сенситив наносят на вату и протирают каждую ноздрю.

В рекомендованной дозе без консультации врача препарат можно применять не более 5-7 дней. Если симптомы усиливаются или улучшение не наступает в течение 3 дней, необходимо проконсультироваться с врачом.

Препарат в дозах выше рекомендованных можно применять только под наблюдением врача.

Спрей назальный

Детям в возрасте от 1 года до 6 лет: по 1 впрыскиванию Називин Сенситив спрея назального дозированного 11.25 мкг/доза в каждую ноздрю 2-3 раза/сут. Препарат применяют 5-7 дней. Препарат можно назначать повторно только спустя несколько дней.

Взрослым и детям старше 6 лет: по 1 впрыскиванию Називин Сенситив спрея назального дозированного 22.5 мкг/доза в каждую ноздрю 2-3 раза/сут.

Если симптомы усиливаются или улучшение не наступает в течение 3 дней, необходимо проконсультироваться с врачом. В рекомендованной дозе без консультации с врачом применять не более 7 дней. Препарат в дозах, превышающих рекомендованные, можно применять только под наблюдением врача.

Одно впрыскивание объемом 45 мкл содержит:

- 11.25 мкг оксиметазолина гидрохлорида для препарата Називин Сенситив спрей назальный дозированный 11.25 мкг/доза:
- 22.5 мкг оксиметазолина гидрохлорида для препарата Називин Сенситив спрей назальный дозированный 22.5 мкг/доза.

Побочное действие:

Местные реакции: от ≥1% до <10% - жжение или сухость слизистой оболочки полости носа, чиханье, сильное чувство заложенности носа (реактивная гиперемия) после того как пройдет эффект от применения препарата Називин Сенситив, нарушение зрения (при попадании в глаза). Длительное непрерывное использование сосудосуживающих препаратов может привести к тахифилаксии, атрофии слизистой оболочки полости носа и возвратному отеку слизистой оболочки полости носа (медикаментозный ринит).

Со стороны сердечно-сосудистой системы: от \geq 0.1% до <1% - повышение АД, тахикардия; возможно - ощущение сердцебиения.

Со стороны нервной системы: от \geq 0.01% до <0.1% - головная боль, бессонница; возможно - головокружение, чувство тревоги, раздражительность, нарушение сна (у детей).

Прочие: возможно - тошнота, экзантема.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, повышение АД, тахикардия, угнетение ЦНС.

Лечение: проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При применении в период беременности или грудного вскармливания не следует превышать рекомендуемую дозу. Препарат может применяться только в тех случаях, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат замедляет всасывание местноанестезирующих лекарственных средств, удлиняет их действие.

При применении препарата Називин Сенситив в течение 2 недель до назначения ингибиторов МАО и в течение 2 недель после их отмены, на фоне лечения трициклическими антидепрессантами или другими препаратами, способствующими повышению АД, наблюдается повышение АД.

Совместное назначение других сосудосуживающих лекарственных средств повышает риск развития побочных эффектов.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания препарата в глаза.

Во избежание распространения инфекции необходимо применять препарат индивидуально.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

После длительного применения средств от насморка, содержащих оксиметазолин, в дозах, превышающих рекомендуемые, нельзя исключать общее влияние на сердечно-сосудистую систему и ЦНС. В этих случаях пациенты должны соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

С осторожностью следует применять препарат при хронической почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 1 года (для препарата Називин Сенситив спрей назальный дозированный 11.25 мкг/доза), в детском возрасте до 6 лет (для препарата Називин Сенситив спрей назальный дозированный 22.5 мкг/доза).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Nazivin Sensitiv

Називин Сенситив Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)