# Назол Адванс




## Код АТХ:

- R01AA05

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Оксиметазолин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Спрей назальный 0.05%*** в виде прозрачного, бесцветного раствора со слабым запахом ментола и камфоры.

| | **1 мл** |
|---|---|
| оксиметазолина гидрохлорид | 500 мкг |

*Вспомогательные вещества:* бензалкония хлорид (50% раствор), камфора, эвкалиптол, ментол, бензиловый спирт, динатрия эдетат, полисорбат 80, пропиленгликоль, натрия гидрофосфат, натрия дигидрофосфат, вода очищенная.

15 мл - флаконы из полиэтилена низкой плотности (1) с распылителем - пачки картонные.
30 мл - флаконы из полиэтилена низкой плотности (1) с распылителем - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Вегетотропные средства
- Органотропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике.

Оксиметазолин относится к группе альфа-адреномиметиков для местного применения. Оказывает сосудосуживающее действие. При интраназальном введении уменьшает отечность слизистой оболочки верхних отделов дыхательных путей, что приводит к облегчению носового дыхания и открытию устьев придаточных пазух и евстахиевых труб. Действие препарата проявляется через 10-15 мин после применения и продолжается в течение 10-12 ч.

***Фармакокинетика***

Данные о фармакокинетике препарата Назол Адванс не предоставлены.

## Показания к применению:

— для облегчения носового дыхания при простудных заболеваниях и вирусных инфекциях верхних отделов дыхательных путей, синусите, рините любой этиологии.

## Относится к болезням:

- Инфекции
- Ринит
- Синусит

## Противопоказания:

— атрофический ринит;

— детский возраст до 6 лет;

— беременность;

— период лактации;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ИБС, хроническая сердечная недостаточность, тахикардия, аритмии), нарушением углеводного обмена (сахарный диабет), нарушением функции щитовидной железы (гипертиреоз), феохромоцитомой, гиперплазией предстательной железы с клиническими симптомами, хронической почечной недостаточностью, закрытоугольной глаукомой, при одновременном применении ингибиторов МАО, трициклических антидепрессантов.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым и детям старше 12 лет** назначают по 2-3 впрыскивания в каждый носовой ход 2 раза/сут, **детям в возрасте от 6 до 12 лет** (под наблюдением взрослых) - по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2 раза/сут. Не следует применять препарат чаще 2 раз/сут.

Не рекомендуется применять препарат более 3 дней. При частом или длительном использовании препарата чувство затруднения носового дыхания может появиться вновь или ухудшиться. При появлении этих симптомов следует прекратить лечение и обратиться к врачу.

При впрыскивании не запрокидывать голову назад и не распылять в положении лежа.

## Побочное действие:

*Местные реакции:* иногда чувство жжения или сухость носовых оболочек, сухость в полости рта и глотки, чиханье, увеличение объема секрета, выделяющегося из носа. В редких случаях, после того, как пройдет эффект от применения препарата, сильное чувство "заложенности" носа (реактивная гиперемия).

*Системные реакции:* повышение АД, головная боль, головокружение, сердцебиение, повышенная тревожность, тошнота, бессонница. При длительном применении препарата (более 7 дней) возможны реактивная гиперемия слизистой оболочки носа, атрофия слизистой оболочки носа.

## Передозировка:

*Симптомы:* длительное или частое применение препарата в носовую полость может вызвать тошноту, повышение АД, тахикардию, угнетение ЦНС.

*Лечение:* проводят симптоматическую терапию.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами может наблюдаться повышение АД.

Препарат замедляет всасывание местноанестезирующих препаратов, удлиняет их действие.

Совместное назначение других сосудосуживающих препаратов повышает риск развития побочных эффектов.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется применять Назол Адванс более 3 дней.

Следует избегать попадания препарата в глаза. Препарат оказывает влияние на зрение, возможно снижение скорости реакции.

Во избежание распространения инфекции необходимо использовать препарат индивидуально.

***При нарушениях функции почек***

С осторожностью следует назначать препарат при хронической почечной недостаточности.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказано: детский возраст до 6 лет. Д**етям в возрасте от 6 до 12 лет** (под наблюдением взрослых) - по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2 раза/сут.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей, при температуре от 2° до 25°С.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Nazol_Advans