

Назол Бэби



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Фенилэфрин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Капли назальные 0.125%** в виде прозрачного раствора, от бесцветного до светло-желтого цвета, без запаха.

	1 мл
фенилэфрина гидрохлорид	1.25 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 50%, динатриевая соль этилендиамина тетрауксусной кислоты (динатрия эдетат), полиэтиленгликоль, глицерол, натрия фосфат двузамещенный, калия фосфат однозамещенный, вода очищенная.

5 мл - флаконы из полиэтилена низкой плотности (1) - пачки картонные.
10 мл - флаконы из полиэтилена низкой плотности (1) - пачки картонные.
15 мл - флаконы из полиэтилена низкой плотности (1) - пачки картонные.
30 мл - флаконы из полиэтилена низкой плотности (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике, является агонистом α_1 -адренорецепторов (симпатомиметик). Оказывает сосудосуживающее действие за счет стимуляции α_1 -адренорецепторов в слизистой оболочке носа: уменьшает набухание, застойные явления и гиперемия тканей в слизистой оболочке носа, а также улучшает проходимость носовых дыхательных путей.

Фармакокинетика

При местном применении препарата системная абсорбция низкая.

Показания к применению:

Для облегчения дыхания через нос при:

— простудных заболеваниях и гриппе;

— сенной лихорадке или других аллергических заболеваниях верхних отделов дыхательных путей, сопровождающихся острым ринитом или синуситом.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Грипп](#)
- [Лихорадка](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

Противопоказания:

— заболевания сердечно-сосудистой системы (в т.ч. коронаросклероз, стенокардия);

— гипертонический криз;

— тиреотоксикоз;

— сахарный диабет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью применяют препарат у детей младше 6 лет.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют интраназально. Продолжительность лечения составляет не более 3 дней.

Для **детей в возрасте до 1 года** разовая доза - 1 капля не чаще, чем каждые 6 ч.

Для **детей в возрасте от 1 года до 6 лет** разовая доза составляет 1-2 капли.

Для **детей в возрасте старше 6 лет и взрослых** разовая доза составляет 3-4 капли.

Для закапывания необходимо слегка сжать флакон, держа его вверх дном. После использования следует насухо вытереть пипетку на флаконе.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, тремор, нарушение сна.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, аритмия, повышение АД.

Местные реакции: иногда - жжение, пощипывание или покалывание в носу.

Прочие: потливость, бледность.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Симптомы: возможны при системной абсорбции - желудочковая экстрасистолия, короткие пароксизмы желудочковой тахикардии, ощущение тяжести в голове и конечностях, чрезмерное повышение АД, возбуждение.

Лечение: в/в введение альфа-адреноблокаторов короткого действия (фентоламина) и бета-адреноблокаторов (при нарушениях ритма).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Достаточного опыта по применению препарата при беременности нет.

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Ингибиторы МАО (прокарбазин, селегилин), трициклические антидепрессанты, мапротилин, гуанедрел, гуанетидин усиливают прессорный эффект и аритмогенность фенилэфрина (при системной абсорбции).

Тиреоидные гормоны увеличивают (взаимно при системной абсорбции фенилэфрина) связанный с ним риск возникновения коронарной недостаточности (особенно при коронарном атеросклерозе).

Особые указания и меры предосторожности:

У детей в возрасте до 1 года препарат следует применять строго по назначению врача и не чаще, чем каждые 6 ч. У детей системная абсорбция фенилэфрина и связанный с ним риск развития побочных эффектов выше, чем у взрослых.

Не следует назначать фенилэфрин пациентам в течение 2 недель после отмены ингибиторов МАО, поскольку они могут усиливать выраженность адренергических эффектов симпатомиметиков и увеличить риск возникновения побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы.

Применение в детском возрасте

С осторожностью применяют препарат у детей младше 6 лет

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 30°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Nazol_Bebi