# Назол Кидс



## Код АТХ:

• R01AA04

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

Фенилэфрин

#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия  $\frac{MHH}{MH}$  PJC VIDAL Mail.Ru Drugs.com  $\frac{ahrJ}{MH}$ 

## Форма выпуска:

 $\Diamond$  **Спрей назальный для детей 0.25%** в виде прозрачного, бесцветного или с желтоватым оттенком раствора со слабым запахом эвкалипта.

|                         | 1 мл   |
|-------------------------|--------|
| фенилэфрина гидрохлорид | 2.5 мг |

Вспомогательные вещества: эвкалиптол (400 мкг), глицерол, макрогол, натрия гидрофосфат, калия дигидрофосфат, динатрия эдетат, бензалкония хлорид, вода очищенная.

15 мл - флаконы пластиковые (1) с распылителем - пачки картонные.

30 мл - флаконы пластиковые (1) с распылителем - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Вегетотропные средства
- Органотропные средства

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике, агонист  $\alpha_1$ -адренорецепторов (симпатомиметик). Оказывает сосудосуживающее действие за счет стимуляции  $\alpha_1$ -адренорецепторов в слизистой оболочке носа: уменьшает набухание, застойные явления и гиперемию тканей в слизистой оболочке носа, а также улучшает проходимость носовых дыхательных путей.

### Фармакокинетика

При местном применении препарата системная абсорбция низкая.

## Показания к применению:

Для облегчения дыхания через нос при:

- простудных заболеваниях и гриппе;
- сенной лихорадке или других аллергических заболеваниях верхних отделов дыхательных путей, сопровождающихся острым ринитом или синуситом.

### Относится к болезням:

- Аллергия
- Грипп
- Лихорадка
- Ринит
- Синусит

### Противопоказания:

- заболевания сердечно-сосудистой системы (в т.ч. выраженный атеросклероз, стенокардия, тахикардия);
- артериальная гипертензия;
- тиреотоксикоз;
- сахарный диабет;
- детский возраст до 4 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Детям в возрасте от 6 до 12 лет назначают по 2-3 впрыскивания в каждый носовой ход, не чаще чем каждые 4 ч.

### Побочное действие:

Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, тремор, нарушение сна.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, аритмия, повышение АД.

Местные реакции: иногда - жжение, пощипывание или покалывание в носу.

Прочие: потливость, бледность.

### Передозировка:

Симптомы: нарушение сердечного ритма, повышение АД, возбуждение.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Достаточного опыта по применению препарата при беременности нет.

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода или ребенка.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Ингибиторы MAO (прокарбазин, селегилин), трициклические антидепрессанты, мапротилин, гуанедрел, гуанетидин усиливают прессорный эффект и аритмогенность фенилэфрина (при системной абсорбции).

Тиреоидные гормоны увеличивают (взаимно при системной абсорбции фенилэфрина) связанный с ним риск возникновения коронарной недостаточности (особенно при коронарном атеросклерозе).

### Особые указания и меры предосторожности:

У детей системная абсорбция фенилэфрина и связанный с ним риск развития побочных эффектов выше, чем у взрослых людей.

Продолжительность применения препарата не должна превышать 3 суток, при сохранении затрудненного носового дыхания дальнейшее применение препарата следует согласовать с врачом.

Не следует назначать фенилэфрин пациентам в течение 2-х недель после отмены ингибиторов МАО, поскольку они могут усиливать выраженность адренергических эффектов симпатомиметических средств и увеличить риск возникновения побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы.

Не рекомендуется пользоваться одним и тем же флаконом нескольким лицам, во избежание распространения инфекции.

При сжатии флакона в вертикальном положении раствор выделяется из него в виде спрея, при сжатии флакона в перевернутом положении - по каплям.

#### Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 4 лет. У детей системная абсорбция фенилэфрина и связанный с ним риск развития побочных эффектов выше, чем у взрослых людей.

### Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от  $15^{\circ}$ до  $25^{\circ}$ С.

### Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Nazol\_Kids