Нефлуан



Код АТХ:

- G04BX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Лидокаин
- Неомицин
- Флуоцинолона ацетонид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Гель для местного применения прозрачный, однородный, практически бесцветный.

	1 г
неомицина сульфат	5 мг
флуоцинолона ацетонид	250 мкг
лидокаина гидрохлорид	25 мг

Вспомогательные вещества: натрия карбоксиметилцеллюлоза, натрия цитрат, глицерол, пропиленгликоль, метилпарагидроксибензоат, этилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, натрия бензоат, вода очищенная.

10 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с пластмассовыми уретральными удлинителями (2 шт.) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Гормоны и их антагонисты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения.

Лидокаина гидрохлорид оказывает местное анестезирующее действие.

Неомицина сульфат - антибиотик из группы аминогликозидов с широким спектром бактерицидного действия.

Активен в отношении грамположительных кокков, грамотрицательных палочек и актиномицетов.

Флуоцинолона ацетонид - синтетический ГКС, при местном применении оказывает противовоспалительное действие. Не влияет на антибактериальную активность неомицина и усиливает местноанестезирующее действие лидокаина.

Показания к применению:

— диагностические и лечебные процедуры (в т.ч. цистоскопия, катетеризация мочевого пузыря, расширение уретры, кольпоскопия, ректоскопия, колоноскопия);

— острые и хронические неспецифические воспалительные заболевания нижних отделов мочевыводящих путей (в т.ч. острый цистит, обострение хронического цистита, уретрит);

— инфекционно-воспалительные заболевания прямой кишки (в т.ч. геморрой, острая анальная трещина, криптит, анусит);

— воспалительные изменения кожи при активных свищах прямой кишки.

Относится к болезням:

- Анальные трещины
- Геморрой
- Инфекции
- Кольпит
- Кольпит
- Уретрит
- Цистит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к лидокаину и другим анестетикам амидного ряда;

— повышенная чувствительность к неомицину, флуоцинолону и другим компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат у детей, пациентов пожилого возраста и ослабленных пациентов.

Способ применения и дозы:

При *проведении эндоуретральных процедур* гель выдавливают из тубы непосредственно в уретру путем сдавливания тубы и одновременного массажирования задней стенки уретры. Затем на уретру накладывают зажим, который снимают через 10 мин, после чего проводятся эндоуретральные процедуры.

Для упрощения введения препарата и снятия боли, которая может возникать при прикосновении металлической части наконечника тубы к болевым зонам, к тубе прилагается пластмассовый удлинитель, навинчиваемый на ее наконечник непосредственно перед применением препарата.

Гель рекомендуется вводить за несколько минут до начала диагностических или лечебных манипуляций, а также повторно сразу после их окончания.

Содержимого одной тубы достаточно для заполнения всей уретры, однако в некоторых случаях дозу можно изменять в зависимости от степени поражения и необходимого эффекта.

При проведении эндоскопических исследований в проктологии (ректороманоскопия, колоноскопия) гель вводят в анальный канал за 10-15 мин до процедуры и повторно непосредственно перед ее началом.

При *инфекционно-воспалительных заболеваниях нижних отделов мочевыводящих путей* гель вводят в уретру 1-2 раза/сут на протяжении 5-10 дней.

При *инфекционно-воспалительных заболеваниях прямой кишки* гель наносят на пораженную поверхность кожи и слизистой оболочки и вводят в анальный канал с помощью удлинителя (после опорожнения кишечника и гигиенических процедур) 3 раза/сут на протяжении 10-14 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожный зуд, ощущение жжения, гиперемия кожи.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Нефлуан не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных и строго контролируемых исследований по применению препарата при беременности и в период лактации не проводилось. Поэтому назначение препарата при беременности (особенно на ранних стадиях) и в период лактации (грудного вскармливания) нежелательно или должно быть тщательно обосновано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Нефлуан не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Эффективность и безопасность Нефлуана, как и другого местного анестетика, зависит от правильного дозирования и техники его применения.

Для предотвращения побочных эффектов следует, по возможности, использовать минимальные эффективные дозы препарата.

Для полной анестезии уретры при проведении любых инструментальных вмешательств обычно достаточно 1 тубы Нефлуана.

Риск развития побочных эффектов возрастает при очень длительном или непрерывном применении, применении в высоких дозах или при наличии обширных поражений кожи и слизистых оболочек.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не установлено влияние препарата на способность к выполнению работы, требующей концентрации внимания.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 8° до 30°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Nefluan