

[Немоцид](#)



Код АТХ:

- [P02CC01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Пирантел](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогельминтное средство. Вызывает нейромышечную блокаду чувствительных гельминтов. Активен в отношении *Enterobius vermicularis*, *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus* и, в меньшей степени, *Trichocephalus trichiurus*. Действует как на половозрелых, так и на неполовозрелых особей обоего пола.

Фармакокинетика

Практически не абсорбируется из ЖКТ. После приема разовой дозы 10 мг/кг концентрация в плазме составляет 0.005-0.13 мкг/мл и достигается в течение 1-3 ч. Метаболизируется частично в печени до N-метил-1,3-пропанедиамин. Выводится в неизменном виде через кишечник (около 93%), 7% выводится почками в неизменном виде или в виде метаболита.

Показания к применению:

Аскаридоз, анкилостомидоз, некатороз, трихоцефалез.

Противопоказания:

Беременность, повышенная чувствительность к пирантелу, миастения (период лечения).

Способ применения и дозы:

При аскаридозе и энтеробиозе применяют однократно в дозе 10 мг/кг. При сочетании некатороза с аскаридозом или других сочетанных гельминтных поражениях применяют в течение 3 дней подряд в дозе 10 мг/кг/сут или в течение 2 дней - в дозе 20 мг/кг/сут.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, анорексия, повышение активности печеночных трансаминаз.

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, галлюцинации, спутанность сознания, парестезии, головокружение, сонливость или бессонница.

Дерматологические реакции: кожная сыпь, крапивница.

Прочие: нарушение слуха, гипертермия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Пирантел противопоказан к применению при беременности.

При необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует назначать одновременно с пиперазином (ослабление действия).

При одновременном применении пирантел повышает концентрацию теофиллина в плазме.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применять при печеночной недостаточности.

После приема пирантела слабительные средства не назначают.

При энтеробиозе следует провести одновременное лечение всех совместно проживающих лиц. После завершения лечения необходимо провести контрольное исследование кала на наличие яиц паразитов.

С осторожностью назначают детям в возрасте до 6 месяцев.

При нарушениях функции печени

С осторожностью применять при печеночной недостаточности.

Применение в детском возрасте

С осторожностью назначают детям в возрасте до 6 месяцев.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Nemocid>