

Нео-Ангин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амилметакрезол](#)
- [Дихлорбензиловый спирт](#)
- [Левоментол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептический комбинированный препарат для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии. Оказывает противомикробное, местноанестезирующее, противовоспалительное, анальгезирующее и дезодорирующее действие.

Коагулирует белки микробных клеток; активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*; оказывает противогрибковое действие.

Устраняет симптомы раздражения слизистых оболочек верхних дыхательных путей, оказывает деконгестивное действие на слизистую оболочку. Уменьшает заложенность носа. Смягчает раздражение и боль в горле.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта, горла, гортани:

— тонзиллит;

— фарингит;

— ларингит (в т.ч. профессионального характера - у преподавателей, дикторов, работников химической и угольной промышленности);

— охриплость;

— воспаление слизистой оболочки полости рта и десен (афтозный стоматит, гингивит, молочница).

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Гингивит](#)
- [Ларингит](#)
- [Молочница](#)
- [Тонзиллит](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— детский возраст (до 6 лет).

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям (старше 6 лет) - каждые 2-3 ч рассасывать по 1 таб.

Максимальная суточная доза - 8 таб.

Побочное действие:

Аллергические реакции, диспепсия.

Особые указания и меры предосторожности:

При случайном пропуске одного или нескольких приемов дозу не повышают.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст (до 6 лет).

Источник: <http://drugs.thead.ru/Neo-Angin>