# **Необутин**



## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Тримебутин

#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия  $\frac{MHH}{MH}$  PJC VIDAL Mail.Ru Drugs.com  $\frac{AHFJ}{MH}$ 

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Средство, регулирующее перистальтику ЖКТ. Полагают, что эффект тримебутина обусловлен влиянием на опиоидные рецепторы ЖКТ.

#### Показания к применению:

Для приема внутрь и ректально: симптоматическое лечение болей, связанных с функциональными расстройствами ЖКТ и желчевыводящих путей.

Для парентерального применения: симптоматическое лечение выраженных болевых проявлений при функциональных нарушениях ЖКТ; лечение постоперационного паралитического илеуса и при подготовке к проведению рентгеновского и эндоскопического исследований.

### Относится к болезням:

• Паралич

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к тримебутину.

# Способ применения и дозы:

Индивидуальный. Суточная доза для приема внутрь - до 300 мг, ректально - 100-200 мг. В/м или в/в разовая доза - 50 мг, частота и длительность применения зависят от клинической ситуации.

У детей дозу устанавливают в зависимости от возраста.

# Побочное действие:

Возможно: кожные аллергические реакции; при в/в введении - кратковременные обмороки.

# Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

# Особые указания и меры предосторожности:

Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы показаниям к применению.

#### Применение в детском возрасте

У детей дозу устанавливают в зависимости от возраста.

Источник: http://drugs.thead.ru/Neobutin