

Необутин Ретард



Код АТХ:

- [A03AA05](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тримебутин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

♦ **Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой** белого или почти белого цвета, продолговатые, двояковыпуклые, со скругленными концами; на одной стороне таблетки методом тиснения нанесена маркировка "SR"; на поперечном разрезе - ядро белого или почти белого цвета.

	1 таб.
тримебутина малеат	300 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 180 мг, винная кислота - 120 мг, гипромеллоза - 120 мг, повидон К30 - 12 мг, кремния диоксид коллоидный - 7.5 мг, магния стеарат - 7.5 мг.

Состав оболочки: гипромеллоза - 6.82 мг, тальк - 1.35 мг, опадрай белый М-1-7111 (титана диоксид - 30%, этанол денатурированный (спирт метилированный) - 10%, гипромеллоза-2910 - 3%, вода - 57%) - 2.25 мг, кремиевый пеногаситель - q.s,

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство, регулирующее перистальтику ЖКТ. Полагают, что эффект тримебутина обусловлен влиянием на опиоидные рецепторы ЖКТ.

Показания к применению:

Для приема внутрь и ректально: симптоматическое лечение болей, связанных с функциональными расстройствами ЖКТ и желчевыводящих путей.

Для парентерального применения: симптоматическое лечение выраженных болевых проявлений при функциональных нарушениях ЖКТ; лечение постоперационного паралитического илеуса и при подготовке к проведению рентгеновского и эндоскопического исследований.

Относится к болезням:

- [Паралич](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к тримебутину.

Способ применения и дозы:

Индивидуальный. Суточная доза для приема внутрь - до 300 мг, ректально - 100-200 мг. В/м или в/в разовая доза - 50 мг, частота и длительность применения зависят от клинической ситуации.

У детей дозу устанавливают в зависимости от возраста.

Побочное действие:

Возможно: кожные аллергические реакции; при в/в введении - кратковременные обмороки.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Аллергический дерматит у детей
- Коклюш
- Круп
- Лечение и профилактика недержания мочи у детей

Источник: http://drugs.thead.ru/Neobutin_Retard