

## Неогеп



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

**Капсулы** желтые, твердые, непрозрачные, желатиновые, № 00; содержимое капсул - порошок или гранулят белого с желтоватым оттенком или светло-желтого цвета, со слабым специфическим запахом.

	<b>1 капс.</b>
1-(4-бромфенил)виолуровая кислота	500 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, гипролоза, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный (аэросил).

Капсула желатиновая твердая № 00: желатин, титана диоксид (E171), краситель хинолиновый желтый (E104), краситель солнечный закат желтый (E110).

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Гепатопротекторное средство, уменьшает дистрофические изменения в паренхиме печени. При острых и хронических поражениях печени уменьшает проявления цитолиза, нормализует пигментобразующую и антиоксидантную функцию печени, уменьшает явления холестаза, снижает воспалительную реакцию.

#### Фармакокинетика

Относительная биодоступность составляет около 73%.  $C_{max}$  1-(4-бромфенил)виолуровой кислоты в плазме крови отмечается через 6 ч после приема препарата. Время удержания препарата в организме 11 ч. Величина кажущегося стационарного  $V_d$  - около 116 мл/кг.  $T_{1/2}$  около 6 ч. Выводится преимущественно почками.

### Показания к применению:

Острые гепатиты, хронические гепатиты, цирроз печени, жировая дегенерация печени различной этиологии, токсические поражения печени, включая алкогольные, вирусные и лекарственные (антибиотики, противоопухолевые, противотуберкулезные, противовирусные препараты, трициклические антидепрессанты, пероральные контрацептивы).

**Относится к болезням:**

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Жировая дегенерация печени](#)
- [Цирроз печени](#)

**Противопоказания:**

Возраст до 18 лет (вследствие отсутствия данных клинических исследований); повышенная чувствительность к активному веществу.

**Способ применения и дозы:**

Принимают внутрь, за 30 мин до еды, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости.

Рекомендуемая доза составляет 2000 мг 2 раза/сут (утром и вечером). Суточная доза - 4000 мг.

Курс лечения - 7 дней.

**Побочное действие:**

*Возможно:* аллергические реакции (в т.ч. крапивница), изменение цвета мочи на розово-фиолетовый.

*В клинических исследованиях наблюдались также следующие нежелательные реакции:* ощущение тяжести в эпигастральной области, отрыжка, изжога, нарушение сна, ускорение СОЭ, тромбоцитопения, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, лимфоцитоз.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (вследствие отсутствия данных клинических исследований).

**Особые указания и меры предосторожности:**

Диагнозы

- Амебиаз
- Аскаридоз
- Бешенство
- Болезнь Лайма

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Neogep>