Неогеп



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Капсулы желтые, твердые, непрозрачные, желатиновые, № 00; содержимое капсул - порошок или гранулят белого с желтоватым оттенком или светло-желтого цвета, со слабым специфическим запахом.

	1 капс.
1-(4-бромфенил)виолуровая кислота	500 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, гипролоза, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный (аэросил).

Капсула желатиновая твердая № 00: желатин, титана диоксид (Е171), краситель хинолиновый желтый (Е104), краситель солнечный закат желтый (Е110).

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гепатопротекторное средство, уменьшает дистрофические изменения в паренхиме печени. При острых и хронических поражениях печени уменьшает проявления цитолиза, нормализует пигментобразующую и антитоксическую функцию печени, уменьшает явления холестаза, снижает воспалительную реакцию.

Фармакокинетика

Относительная биодоступность составляет около 73%. C_{max} 1-(4-бромфенил)виолуровой кислоты в плазме крови отмечается через 6 ч после приема препарата. Время удержания препарата в организме 11 ч. Величина кажущегося стационарного V_d - около 116 мл/кг. $T_{1/2}$ около 6 ч. Выводится преимущественно почками.

Показания к применению:

Острые гепатиты, хронические гепатиты, цирроз печени, жировая дегенерация печени различной этиологии, токсические поражения печени, включая алкогольные, вирусные и лекарственные (антибиотики, противоопухолевые, противотуберкулезные, противовирусные препараты, трициклические антидепрессанты, пероральные контрацептивы).

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Жировая дегенерация печени
- Цирроз печени

Противопоказания:

Возраст до 18 лет (вследствие отсутствия данных клинических исследований); повышенная чувствительность к активному веществу.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь, за 30 мин до еды, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости.

Рекомендуемая доза составляет 2000 мг 2 раза/сут (утром и вечером). Суточная доза - 4000 мг.

Курс лечения - 7 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции (в т.ч. крапивница), изменение цвета мочи на розово-фиолетовый.

В клинических исследованиях наблюдались также следующие нежелательные реакции: ощущение тяжести в эпигастральной области, отрыжка, изжога, нарушение сна, ускорение СОЭ, тромбоцитопения, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, лимфоцитоз.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (вследствие отсутствия данных клинических исследований).

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Амебиаз
- Аскаридоз
- Бешенство
- Болезнь Лайма

Источник: http://drugs.thead.ru/Neogep