

## Неогепатект



### **Код АТХ:**

- [J06BB04](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Иммуноглобулин человека против гепатита В](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Иммунотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Иммунологическое средство. Действующим началом являются антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В.

Антитела блокируют рецепторы вируса и тем самым снижают риск развития инфекции.

#### **Фармакокинетика**

$C_{max}$  антител в крови достигается через 24 ч.  $T_{1/2}$  антител составляет 4-5 недель.

### **Показания к применению:**

Экстренная профилактика гепатита В у детей и взрослых.

### **Относится к болезням:**

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)

### **Противопоказания:**

Тяжелые аллергические реакции на введение препаратов крови человека в анамнезе.

## **Способ применения и дозы:**

Доза и кратность введения иммуноглобулина зависят от показаний.

## **Побочное действие:**

*Местные реакции:* редко - гиперемия кожи.

*Системные реакции:* редко - повышение температуры тела до 37.5°C в течение первых суток после введения; в отдельных случаях - аллергические реакции различного типа (у лиц с измененной реактивностью); в единичных случаях - анафилактический шок.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Данные о безопасности применения иммуноглобулина человеческого против гепатита В при беременности и в период лактации отсутствуют.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Вакцинацию против кори, эпидемического паротита и краснухи проводят не ранее, чем через 2 мес после введения данного иммуноглобулина.

При наличии в анамнезе клинически выраженных аллергических реакций в день введения иммуноглобулина и в течение последующих 3 дней показано назначение антигистаминных препаратов.

Пациентам с иммунопатологическими системными заболеваниями (коллагенозы, иммунные заболевания крови, нефрит) данный иммуноглобулин следует вводить на фоне соответствующей патогенетической терапии.

В кабинетах, где проводится иммунизация, необходимо иметь лекарственные средства для противошоковых мероприятий и купирования анафилактической реакции. После введения иммуноглобулина пациент должен находиться под медицинским наблюдением в течение 30 мин.

Введение иммуноглобулина регистрируют в установленных учетных формах с указанием номера серии, даты выпуска, срока годности, предприятия-изготовителя, даты введения, дозы, характера реакции на введение.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Neogepatekt>