

## Неоинтестопан



### Код АТХ:

- [A07BC04](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аттапулгит](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** розового с серовато-коричневым оттенком цвета, с вкраплениями, круглые, двояковыпуклые.

	<b>1 таб.</b>
аттапулгит	630 мг

*Вспомогательные вещества:* пропилгидроксibenзоат, магния стеарат, пектин, крахмал кукурузный, сахароза, карнаубский воск, воск пчелиный белый, цетиловый спирт, масло арахисовое гидрогенизированное, железа оксид красный, макрогол 6000, стеариновая кислота, целлюлоза микрокристаллическая, повидон, кремния диоксид коллоидный, титана диоксид, тальк.

10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противодиарейный препарат. Адсорбирует патогенные возбудители и образуемые ими токсины. Уменьшает интоксикацию и нормализует кишечную флору. Способствует образованию оформленного стула и уменьшает число опорожнений кишечника. За счет вяжущего эффекта оказывает положительное воздействие на раздраженную слизистую оболочку кишечника. Уменьшает спазм гладкой мускулатуры кишечника.

#### Фармакокинетика

Аттапульгит не всасывается из ЖКТ.

## Показания к применению:

Острая диарея, возникшая в результате:

- пищевого отравления, аллергии или непереносимости отдельных продуктов питания;
- нарушения равновесия кишечной микрофлоры.

## Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Диарея](#)

## Противопоказания:

- кишечная непроходимость;
- лихорадка;
- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к препарату.

Препарат не показан для лечения хронической диареи и диареи паразитарного генеза.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** препарат назначают в начальной разовой дозе 4 таб., затем по 2 таб. после каждого стула. Максимальная суточная доза составляет 14 таб.

Для **детей в возрасте от 6 до 12 лет** начальная разовая доза - 2 таб., затем принимают по 1 таб. после каждого стула. Максимальная суточная доза - 7 таб.

**Детям в возрасте от 3 до 6 лет** Неоинтестопан назначают с осторожностью, под врачебным контролем; режим дозирования устанавливают индивидуально.

Препарат следует начать принимать сразу при появлении диареи.

Длительность приема Неоинтестопана не должна превышать 2 дней.

Таблетки проглатывают целиком, не разжевывая, запивая жидкостью.

## Побочное действие:

*В отдельных случаях:* запор.

## Передозировка:

Случаев передозировки препарата Неоинтестопан до настоящего времени не описано.

*Лечение:* отмена препарата; промывание желудка.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Клинический опыт применения Неоинтестопана при беременности и в период лактации ограничен. Отрицательное воздействие на рост и развитие плода или ребенка маловероятно.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном приеме Неоинтестопан уменьшает всасывание дигоксина, антибиотиков, антихолинергических средств из ЖКТ.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При повышении температуры тела, появлении крови в кале или при продолжении диареи после 2 дней приема Неоинтестопана следует уточнить диагноз (при необходимости с проведением бактериологического исследования).

Применение Неоинтестопана возможно сочетать с регидратационной терапией.

При назначении Неоинтестопана больным сахарным диабетом следует учитывать, что в состав препарата входит сахароза.

Аттапульгит не задерживает рентгеновские лучи, не окрашивает кал.

### **Применение в детском возрасте**

Для **детей в возрасте от 6 до 12 лет** начальная разовая доза - 2 таб., затем принимают по 1 таб. после каждого стула. Максимальная суточная доза - 7 таб.

**Детям в возрасте от 3 до 6 лет** Неоинтестопан назначают с осторожностью, под врачебным контролем; режим дозирования устанавливают индивидуально.

Препарат противопоказан детям до 3 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в защищенном от влаги и воздействия высоких температур, недоступном для детей месте.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Neointestopan>