

Неосмектин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Смектит диоктаэдрический](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь** от желтовато- или серовато-белого цвета до серовато- или коричневатого-желтого цвета, с запахом ванилина.

	1 пак.
диоктаэдрический смектит	3 г

Вспомогательные вещества: декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат), натрия сахаринат (сахарин натрия), ванилин.

3.76 г - пакетики из комбинированного материала (1) - пачки картонные.
3.76 г - пакетики из комбинированного материала (3) - пачки картонные.
3.76 г - пакетики из комбинированного материала (5) - пачки картонные.
3.76 г - пакетики из комбинированного материала (10) - пачки картонные.
3.76 г - пакетики из комбинированного материала (20) - пачки картонные.
3.76 г - пакетики из комбинированного материала (30) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противодиарейный препарат природного происхождения, обладает адсорбирующим действием. Стабилизирует слизистый барьер, образует поливалентные связи с гликопротеинами слизи, увеличивает количество слизи, улучшает ее гастропротекторные свойства (в отношении действия соляной кислоты, желчных солей, микроорганизмов и их токсинов). Обладает селективными сорбционными свойствами, которые объясняются его дискоидно-кристаллической структурой. Адсорбирует находящиеся в просвете ЖКТ бактерии и вирусы. В терапевтических дозах не оказывает

прямого действия на моторику кишечника.

Фармакокинетика

Не всасывается из ЖКТ, выводится в неизменном виде.

Показания к применению:

- диарея (аллергического, лекарственного генеза; при нарушении режима питания и качественного состава пищи);
- диарея инфекционного генеза (в составе комплексной терапии);
- лечение симптомов, связанных с заболеваниями желудка и кишечника (изжоги, ощущения тяжести, вздутия и дискомфорта в животе).

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Диарея](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- кишечная непроходимость;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при сахарном диабете (в связи с наличием в составе препарата декстрозы).

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 3 г (1 пакетик) 3 раза/сут. Содержимое пакетика растворяют в 100 мл воды, постепенно всыпая порошок и равномерно его размешивая.

Детям в возрасте до 12 лет содержимое пакетика растворяют в 50 мл жидкости. **Детям в возрасте до 1 года** назначают 3 г (1 пакетик) в сут; **в возрасте 1-2 лет** – 6 г (2 пакетика) в сут; **старше 2 лет** – 6-9 г (2-3 пакетика) в сут. Суточную дозу распределяют на 3-4 приема в течение дня.

Побочное действие:

Возможно: запор (как правило, функция кишечника восстанавливается при уменьшении дозы препарата), аллергические реакции.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата Неосмектин не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности применения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Уменьшает скорость и степень всасывания одновременно принимаемых лекарственных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

Для маленьких детей содержимое пакетика растворяют в детской бутылочке (50 мл) и распределяют на несколько приемов в течение дня, или перемешивают с каким-нибудь полужидким продуктом (каша, пюре, компот, детское питание).

В том случае, если разовая доза составляет менее 1 пакетика, приготовленную неиспользованную суспензию следует хранить в закрытой емкости в холодильнике при температуре 2-8°C не более 16 ч. Перед каждым приемом суспензию необходимо тщательно взболтать.

Интервал между приемом препарата Неосмектин и других лекарственных средств должен составлять 1-2 ч.

1 пакетик Неосмектина (3.76 г) содержит 0.06 ХЕ, суточная доза препарата для взрослых (3 пакетика) - 0.19 ХЕ.

Применение в детском возрасте

Возможно применение по показаниям и в дозах, учитывающих возраст пациентов.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Neosmektin>