

## [Неосмектин \(супензия\)](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Смектит диоктаэдрический](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр МНН](#) [Википедия МНН](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)[англ](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Адсорбирующее и противодиарейное средство природного происхождения. Оказывает защитное действие на слизистую оболочку кишечника, обладает выраженным адсорбирующими и слабо выраженным обволакивающим действием. Является стабилизатором слизистого барьера, проникает в слизь и увеличивает продолжительность ее жизни, образуя физический барьер, который защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного действия H<sup>+</sup> ионов, кишечных микроорганизмов и их токсинов.

#### **Фармакокинетика**

Не абсорбируется, выводится в неизмененном виде.

### **Показания к применению:**

Симптоматическое лечение болей, связанных с заболеваниями пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки; кишечная колика; остшая и хроническая диарея (особенно у детей).

### **Относится к болезням:**

- [Кишечная колика](#)
- [Кишечные колики](#)

### **Противопоказания:**

Кишечная непроходимость, повышенная чувствительность к диосмектиту.

### **Способ применения и дозы:**

При приеме внутрь для взрослых суточная доза составляет 9 г. Для детей в возрасте старше 2 лет - 6-9 г/сут, в

в возрасте 1-2 лет - 6 г/сут, в возрасте до 1 года - 3 г/сут.

**Побочное действие:**

*В отдельных случаях:* запоры, аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном приеме внутрь диосмектит уменьшает скорость и/или степень абсорбции других лекарственных препаратов.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Интервал между приемом диосмектита и других лекарственных средств должен составлять 1-2 ч.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Neosmektin\\_suspenziya](http://drugs.thead.ru/Neosmektin_suspenziya)