# Неосмектин (суспензия)



## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Смектит диоктаэдрический

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Адсорбирующее и противодиарейное средство природного происхождения. Оказывает защитное действие на слизистую оболочку кишечника, обладает выраженным адсорбирующим и слабовыраженным обволакивающим действием. Является стабилизатором слизистого барьера, проникает в слизь и увеличивает продолжительность ее жизни, образуя физический барьер, который защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного действия $H^+$ ионов, кишечных микроорганизмов и их токсинов.

***Фармакокинетика***

Не абсорбируется, выводится в неизмененном виде.

## Показания к применению:

Симптоматическое лечение болей, связанных с заболеваниями пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки; кишечная колика; острая и хроническая диарея (особенно у детей).

## Относится к болезням:

- Кишечная колика
- Кишечные колики

## Противопоказания:

Кишечная непроходимость, повышенная чувствительность к диосмектиту.

## Способ применения и дозы:

При приеме внутрь для взрослых суточная доза составляет 9 г. Для детей в возрасте старше 2 лет - 6-9 г/сут, в

возрасте 1-2 лет - 6 г/сут, в возрасте до 1 года - 3 г/сут.

## Побочное действие:

*В отдельных случаях:* запоры, аллергические реакции.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме внутрь диосмектит уменьшает скорость и/или степень абсорбции других лекарственных препаратов.

## Особые указания и меры предосторожности:

Интервал между приемом диосмектита и других лекарственных средств должен составлять 1-2 ч.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Neosmektin_suspenziya