# Несопин



## Код АТХ:

- R01AA05

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Оксиметазолин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Спрей назальный 0.05%*** в виде бесцветной или с желтоватым оттенком цвета, прозрачной или опалесцирующей жидкости.

| | **1 мл** |
|---|---|
| оксиметазолина гидрохлорид | 500 мкг |

*Вспомогательные вещества:* ментол, масло эвкалиптовое, динатрия эдетат, динатрия фосфата додекагидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат, пропиленгликоль, бензиловый спирт, вода д/и (до 1 мл).

10 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с насадкой-распылителем - пачки картонные.
20 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с насадкой-распылителем - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Вегетотропные средства
- Органотропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Альфа-адреномиметик для местного применения. Оказывает сосудосуживающее действие. При интраназальном введении уменьшается отечность слизистой оболочки верхних отделов дыхательных путей.

Действие проявляется через 15 мин после применения и продолжается в течение 8-12 ч.

***Фармакокинетика***

Данные о фармакокинетике препарата Несопин не предоставлены.

## Показания к применению:

— риниты (аллергической и инфекционно-воспалительной этиологии);

— синуситы;

— евстахиит;

— сенная лихорадка.

## Относится к болезням:

- Аллергия
- Евстахиит
- Инфекции
- Лихорадка
- Ринит
- Синусит

## Противопоказания:

— атрофический ринит;

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— детский возраст до 6 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при хронической сердечной недостаточности, аритмии, выраженном атеросклерозе, артериальной гипертензии, тиреотоксикозе, сахарном диабете, хронической почечной недостаточности, закрытоугольной глаукоме.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым и детям старше 12 лет** назначают интраназально по 2-3 впрыскивания в каждый носовой ход с интервалом 10-12 ч.
**Детям от 6 до 12 лет** - по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход с интервалом 10-12 ч.

## Побочное действие:

*Местные реакции:* преходящая сухость и жжение слизистой оболочки полости носа, сухость во рту и горле, чиханье. При длительном применении - тахифилаксия, реактивная гиперемия слизистой оболочки и атрофия слизистой оболочки полости носа.

*Системные реакции:* повышение АД, повышенная тревожность, тошнота, головокружение, головная боль, бессонница, сердцебиение, нарушения сна.

## Передозировка:

*Симптомы:* тахикардия, повышение АД, угнетение ЦНС.

*Лечение:* проводят симптоматическую терапию.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Замедляет всасывание местноанестезирующих лекарственных средств, удлиняет их действие.

Совместное назначение других сосудосуживающих лекарственных средств повышает риск развития побочных эффектов.

При одновременном назначении ингибиторов МАО и трициклических антидепрессантов возможно повышение АД.

## Особые указания и меры предосторожности:

В рекомендованной дозировке без консультации с врачом препарат можно использовать не более 3 дней.

Следует избегать попадания препарата в глаза.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат оказывает влияние на зрение (при попадании в глаза), возможно снижение скорости реакции. В дозировках, превышающих рекомендуемые, может влиять на способность управлять транспортным средством или оборудованием.

***При нарушениях функции почек***

С *осторожностью* следует назначать препарат при хронической почечной недостаточности.

***Применение в детском возрасте***

Применение препарата в детском возрасте до 6 лет противопоказано.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Nesopin