

Несопин



Код АТХ:

- [R01AA05](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Оксиметазолин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндекс](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Спрей назальный 0.05%** в виде бесцветной или с желтоватым оттенком цвета, прозрачной или опалесцирующей жидкости.

	1 мл
оксиметазолина гидрохлорид	500 мкг

Вспомогательные вещества: ментол, масло эвкалиптовое, динатрия эдетат, динатрия фосфата додекагидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат, пропиленгликоль, бензиловый спирт, вода д/и (до 1 мл).

10 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с насадкой-распылителем - пачки картонные.

20 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с насадкой-распылителем - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Альфа-адреномиметик для местного применения. Оказывает сосудосуживающее действие. При интраназальном введении уменьшается отечность слизистой оболочки верхних отделов дыхательных путей.

Действие проявляется через 15 мин после применения и продолжается в течение 8-12 ч.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Несопин не предоставлены.

Показания к применению:

- риниты (аллергической и инфекционно-воспалительной этиологии);
- синуситы;
- евстахиит;
- сенная лихорадка.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Евстахиит](#)
- [Инфекции](#)
- [Лихорадка](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

Противопоказания:

- атрофический ринит;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- детский возраст до 6 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при хронической сердечной недостаточности, аритмии, выраженном атеросклерозе, артериальной гипертензии, тиреотоксикозе, сахарном диабете, хронической почечной недостаточности, закрытоугольной глаукоме.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 12 лет назначают интраназально по 2-3 впрыскивания в каждый носовой ход с интервалом 10-12 ч.

Детям от 6 до 12 лет - по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход с интервалом 10-12 ч.

Побочное действие:

Местные реакции: преходящая сухость и жжение слизистой оболочки полости носа, сухость во рту и горле, чиханье. При длительном применении - тахифилаксия, реактивная гиперемия слизистой оболочки и атрофия слизистой оболочки полости носа.

Системные реакции: повышение АД, повышенная тревожность, тошнота, головокружение, головная боль, бессонница, сердцебиение, нарушения сна.

Передозировка:

Симптомы: тахикардия, повышение АД, угнетение ЦНС.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Замедляет всасывание местноанестезирующих лекарственных средств, удлиняет их действие.

Совместное назначение других сосудосуживающих лекарственных средств повышает риск развития побочных эффектов.

При одновременном назначении ингибиторов МАО и трициклических антидепрессантов возможно повышение АД.

Особые указания и меры предосторожности:

В рекомендованной дозировке без консультации с врачом препарат можно использовать не более 3 дней.

Следует избегать попадания препарата в глаза.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат оказывает влияние на зрение (при попадании в глаза), возможно снижение скорости реакции. В дозировках, превышающих рекомендуемые, может влиять на способность управлять транспортным средством или оборудованием.

При нарушениях функции почек

С осторожностью следует назначать препарат при хронической почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Применение препарата в детском возрасте до 6 лет противопоказано.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Nesopin>