

## Неттависк



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Мазь глазная 0.3%</b>	<b>1 г</b>
тобрамицин (в форме сульфата)	3 мг

3.5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Полусинтетический аминогликозидный антибиотик широкого спектра действия. Связывается с 30S субъединицей рибосом и нарушает синтез белка, препятствуя образованию комплекса транспортной и информационной РНК, при этом происходит нарушение считывания генетического кода и образование нефункциональных белков; полирибосомы расщепляются и теряют способность синтезировать белок. В больших концентрациях снижает барьерные функции клеточных мембран и вызывают гибель микроорганизмов.

Высокоактивен в отношении грамотрицательных микроорганизмов (*Pseudomonasaeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Serratia* spp., *Providencia* spp., *Enterobacter* spp., *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Citrobacter* spp., *Morganella morganii*, *Aeromonas* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp.), а также некоторых грамположительных микроорганизмов (*Staphylococcus* spp., в т.ч. устойчивых к др. аминогликозидам, пенициллину, метициллину, некоторым цефалоспорином), некоторых штаммов *Streptococcus* spp.

#### Фармакокинетика

При местном применении нетилмицина системная абсорбция низкая. Проведенные исследования показывают, что после однократного применения концентрация нетилмицина в слезной жидкости составляет: через 5 мин 256 мкг/мл, через 10 мин 182 мкг/мл, через 20 мин 94 мкг/мл и 27 мкг/мл через 1 ч после применения.

### Показания к применению:

Местное применение для лечения инфекций век и наружных отделов глаза, вызванных чувствительными к нетилмицину микроорганизмами.

### Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

## Противопоказания:

- индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим аминогликозидам;
- детский возраст до 3 лет.

## Способ применения и дозы:

Местно. Полоску мази длиной 0.5-1 см закладывают за нижнее веко 3-4 раза в день. Если применение глазной мази сочетается с применением глазных капель, содержащих нетилмицин, то достаточно применения мази 1 раз в день на ночь.

## Побочное действие:

Побочные эффекты наблюдались менее чем у 2% пациентов. Зарегистрированы случаи появления жжения, зуда в глазу, покраснения конъюнктивы глаза.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности противопоказано. При назначении в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При местном применении Неттависка взаимодействия с другими препаратами не выявлено.

## Особые указания и меры предосторожности:

Длительное местное применение антибиотиков может вызвать резистентность микроорганизмов или возникновение вторичной грибковой инфекции. В случае отсутствия клинического улучшения в течение относительно короткого периода времени или в случае появления признаков раздражения или сенсбилизации применение препарата необходимо прекратить и начать соответствующее лечение.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан: детям до 3 лет.

## Условия хранения:

При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

*Срок годности.* 2 года. После вскрытия тубы препарат следует использовать в течение 28 дней. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Nettavisk>