

Ницерголин



Код АТХ:

- [C04AE02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ницерголин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в виде пористой массы или порошка белого цвета, без запаха.

	1 амп.
ницерголин	4 мг

Вспомогательные вещества: винная кислота 1.04 мг, лактозы моногидрат (сахар молочный) 30 мг.

Растворитель: р-р натрия хлорида 0.9% (5 мл).

Ампулы стеклянные (5) - упаковки контурные ячейковые (1) в комплекте с растворителем (амп. 5 шт. в упаковке контурной ячейковой) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Альфа-адреноблокирующее средство - синтетическое производное алкалоидов спорыньи, с присоединенным бромзамещенным остатком никотиновой кислоты. Оказывает вазодилатирующее (в т.ч. в отношении мозговых артерий) действие. Улучшает микроциркуляцию. Содержащийся остаток никотиновой кислоты оказывает прямое миотропное спазмолитическое действие на мышечную оболочку резистивных сосудов, повышает их проницаемость для глюкозы, что наиболее ярко проявляется в отношении сосудов мозга и конечностей. Улучшает мозговой, легочный и почечный кровоток. Снижает сосудистое сопротивление центральных сосудов, повышает артериальный кровоток, увеличивает доставку кислорода и глюкозы. Улучшает кровоснабжение в конечностях, особенно при недостаточности кровообращения вследствие функциональных артериопатий. В терапевтических дозах не влияет на АД, у больных с артериальной гипертензией может вызвать постепенное умеренное снижение АД.

Фармакокинетика

Абсорбция - высокая. Биодоступность - около 60%. $T_{\max}$ -2-4 ч. Подвергается биотрансформации в печени с образованием неактивных метаболитов. Выводится, в основном, с калом.

Показания к применению:

— нарушения мозгового кровообращения (атеросклероз сосудов головного мозга, тромбоз и тромбоэмболия церебральных артерий, ишемия головного мозга, посттравматическая энцефалопатия, психоорганический синдром);

— вертиго;

— мигрень;

— сосудистые расстройства периферической системы кровообращения (органические и функциональные);

— артериопатия конечностей;

— облитерирующий эндартериит;

— болезнь Рейно;

— диабетическая ангиопатия;

— дистрофические заболевания роговицы;

— диабетическая ретинопатия;

— ишемическая нейропатия зрительного нерва.

Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Ангиопатия](#)
- [Диабетическая ангиопатия](#)
- [Мигрень](#)
- [Нарушение мозгового кровообращения](#)
- [Нейропатия](#)
- [Психоорганический синдром](#)
- [Ретинопатия](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбоэмболия](#)
- [Энцефалит](#)

Противопоказания:

— артериальная гипотензия;

— выраженный атеросклероз периферических сосудов;

— стенокардия напряжения;

— органические поражения сердца;

— инфаркт миокарда;

— беременность;

— период лактации;

— повышенная чувствительность к ницерголину.

Способ применения и дозы:

В/м, в/в и внутриаириально, предварительно растворив в прилагаемом растворе натрия хлорида 0.9%, в/м - по 2-4

мг 2 раза/сут.

В/в капельно - по 4-8 мг на 100 мл физиологического раствора натрия хлорида (при необходимости введение можно повторять несколько раз в день).

Внутриартериально - по 4 мг в 10 мл физиологического раствора натрия хлорида в течение 2 мин.

Лечебное действие развивается постепенно. Курс лечения - не менее 2 мес.

Побочное действие:

Диспепсия (тошнота, рвота, диарея, абдоминальные боли); гиперемия кожи лица и верхней половины туловища, ощущение жара, нарушения сна, снижение АД, головная боль, головокружение, стенокардия, симптомы эрготизма (похолодание конечностей, боль в конечностях); кожный зуд, аллергические реакции.

Передозировка:

Не описана.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Ницерголин усиливает эффекты гипотензивных, анксиолитических и антипсихотических средств.

Антациды и колестирамин замедляют всасывание ницерголина.

Особые указания и меры предосторожности:

После в/в введения для предотвращения ортостатической гипотензии, пациенту необходимо находиться в горизонтальном положении в течение 10-15 мин.

Следует соблюдать осторожность при работе с механизмами. Не рекомендуется прием алкоголя во время лечения.

Условия хранения:

Список Б. Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 10°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Nicergolin>