

Нифурал



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Капсулы** твердые желатиновые № 0 с корпусом и крышечкой желтого цвета; содержимое капсул - смесь порошка и гранул желтого цвета.

	1 капс.
нифуросазид	200 мг

Вспомогательные вещества: сахароза, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

Состав капсул твердых желатиновых (корпус и крышечка капсулы): титана диоксид, оксид железа желтый, желатин.

- 7 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 7 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 7 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
- 8 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 8 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 8 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
- 14 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 14 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 14 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противомикробное средство широкого спектра действия для лечения инфекций ЖКТ (кишечный антисептик), производное нитрофурана. В высоких дозах оказывает бактерицидное действие, в меньших - бактериостатическое.

Активен в отношении грамположительных бактерий: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.; грамотрицательных бактерий: *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Proteus* spp.

Фармакокинетика

Практически не всасывается из ЖКТ. Действует в просвете кишечника.

Показания к применению:

Острая диарея бактериального генеза (при отсутствии подозрений на инвазию).

Относится к болезням:

- [Диарея](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к производным нитрофурана.

Не применять у новорожденных (возраст до 1 месяца) и недоношенных детей.

Способ применения и дозы:

Взрослым - по 200 мг 4 раза/сут. Детям в возрасте от 1 месяца до 2.5 лет - по 100 мг 2-3 раза/сут; старше 2.5 лет - по 200 мг 3 раза/сут. Продолжительность курса лечения - не более 7 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение нифуроксазида при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Одновременный прием этанола может вызывать симптомы гиперчувствительности.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Боли в мышцах
- Гематомы подкожные
- Инородные тела
- Кровотечения

Источник: <http://drugs.thead.ru/Nifural>