

Нифуроксазид-Рихтер



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нифуроксазид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Суспензия для приема внутрь желтого цвета, с банановым запахом.

	5 мл	1 фл. (100 г)
нифуроксазид	220 мг	4 г

Вспомогательные вещества: карбоксиполиметиллен, сахароза, натрия гидроксид, лимонной кислоты моногидрат, противопенная эмульсия (Антифоам Ф), метилпарагидроксibenзоат, ароматизатор банановый (банановая эссенция), вода очищенная.

90 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с двойной дозирующей ложечкой (2.5 и 5 мл) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Кишечный антисептик, производное-5-нитрофурана. *Активен в отношении* большинства возбудителей кишечных инфекций (в т.ч. штаммов-мутантов, устойчивых к другим противомикробным средствам): *грамположительных* (*Staphylococcus* spp.) и *грамотрицательных* (*Escherichia* spp., *Citrobacter* spp., *Enterobacter*, *Klebsiella* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Proteus* spp., *Yersinia* spp.), а также *Vibrio cholerae*.

Не активен в отношении бактерий рода *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp. (*Proteus inconstans*), а также штаммов подгруппы А вида *Providentia alcalifaciens*.

Предполагают, что препарат угнетает активность дегидрогеназ и нарушает синтез белков в патогенных бактериях. В среднетерапевтических дозах обладает бактериостатической активностью, а в более высоких - действует бактерицидно. Эффект проявляется с первых часов лечения. В терапевтических дозах практически не нарушает равновесия симбиотной бактериальной флоры кишечника; не вызывает развития резистентных штаммов патогенных микроорганизмов и перекрестной устойчивости бактерий к другим противомикробным средствам, что позволяет при необходимости при генерализованных инфекциях назначать его в комплексной терапии с системными препаратами.

При кишечных инфекциях вирусного генеза предупреждает развитие бактериальной суперинфекции.

Фармакокинетика

После приема внутрь практически не всасывается из ЖКТ, создавая высокую концентрацию действующего вещества в кишечнике. Благодаря таким фармакокинетическим особенностям препарат оказывает исключительно энтеральное

антисептическое действие, не обладает системной антибактериальной активностью, не вызывает общетоксических эффектов; выводится из организма с калом.

Препарат не оказывает влияния на клинические и биохимические показатели анализа крови.

Показания к применению:

— острая и хроническая диарея, вызванная кишечными грамположительными бактериями (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Haemophilus influenzae*), а также некоторыми грамотрицательными бактериями (*Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Klebsiella* spp., *Escherichia coli*, *Proteus* spp., *Enterobacter* spp.).

Противопоказания:

- аллергия на производные 5-нитрофурана;
- детский возраст до 2 мес;
- недоношенные дети;
- повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют внутрь. Перед применением флакон тщательно взбалтывать до получения однородной суспензии.

Возраст	Доза	Кратность
Дети от 2 мес до 6 мес	1-2 мерные ложки на 2.5мл	2 раза/сут
Дети от 6 мес до 6 лет	1 мерная ложка на 5 мл	3 раза/сут
Дети старше 6 лет	1 мерная ложка на 5 мл	4 раза/сут
Взрослые	1 мерная ложка на 5 мл	4 раза/сут

Одна мерная ложка на 2.5 мл содержит 110 мг нифуроксазида. Одна мерная ложка на 5 мл содержит 220 мг нифуроксазида.

Препарат рекомендуется принимать через равные промежутки времени, не зависимо от приема пищи. Курс лечения - 5-7 дней.

Побочное действие:

Нифуроксазид переносится хорошо, практически не проявляет побочных действий, *редко* может возникнуть временная боль в животе, тошнота, усиление диареи. Эти симптомы не требуют отмены препарата.

В *единичных случаях* возможны: одышка, кожные высыпания, зуд, которые не требуют отмены препарата.

Передозировка:

Симптомы передозировки не описаны. В случае передозировки рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Отсутствуют данные относительно неблагоприятного влияния на плод при применении препарата при беременности. При необходимости, с осторожностью, препарат можно назначать беременным и женщинам, кормящим грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Во время лечения Нифуроксазидом-Рихтер следует избегать одновременного приема пероральных средств из-за сильных адсорбционных свойств препарата.

Поскольку нифуроксазид не поступает в систему кровообращения, взаимодействие с системными препаратами маловероятно и пока еще не известно.

Особые указания и меры предосторожности:

Во время лечения Нифуроксазидом-Рихтер противопоказано употребление алкогольных напитков, т.к. алкоголь повышает чувствительность организма к препарату и может спровоцировать дисульфирамоподобную реакцию (обострение диареи, рвота, боль в животе, гиперемия кожи, ощущение жара на лице и верхней части туловища, шум в голове, затрудненное дыхание, тахикардия, ощущение страха).

Препарат не назначают в качестве монотерапии для лечения кишечных инфекций, осложненных септицемией.

При наличии симптомов обезвоживания комплексно с лечением необходимо проводить регидратационную терапию (взрослым - около 2 л жидкости в сутки).

Во время лечения следует придерживаться определенной диеты: не употреблять сырых фруктов и овощей, соков, острых и жирных блюд.

До назначения суспензии грудным детям необходимо исключить у них врожденный дефицит ферментов, расщепляющих сахарозу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нифуроксазид не влияет на способность управления транспортными средствами и работе с механизмами.

Применение в детском возрасте

Возможно применение по показаниям и в дозах, учитывающих возраст пациента.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Nifuroksazid-Rihter>