

[Нифуроксазид \(суспензия\)](#)



Код АТХ:

- [A07AX03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нифуроксазид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Суспензия для приема внутрь** желтого цвета, с ароматом дыни.

	5 мл
нифуроксазид	200 мг

Вспомогательные вещества: сахароза - 1000 мг, натрия гидроксид - 2 мг, метилпарагидроксibenзоат - 5 мг, карбомер (карбопол 947 Р) - 10.5 мг, лимонной кислоты моногидрат - 0.4 мг, ароматизатор Дыня МА/1-140 - 5 мг, вода очищенная - до 5 мл.

90 мл - флаконы (1) в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные.
100 мл - флаконы (1) в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные.
110 мл - флаконы (1) в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные.
115 мл - флаконы (1) в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные.
125 мл - флаконы (1) в комплекте с мерным стаканчиком - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — бактерицидное, антибактериальное.

Фармакодинамика

Эффективен в отношении грамположительных (стафилококки, стрептококки) и некоторых грамотрицательных (*Salmonella*, *Shigella*, *Klebsiella*, *Escherichia coli*) бактерий, не влияет на состав нормальной микрофлоры толстого кишечника. Предположительно ингибирует активность дегидрогеназ и синтез белков в клетках бактерий. Не вызывает возникновения лекарственно-устойчивых штаммов, а также перекрестной устойчивости с другими

Нифуроксазид (суспензия)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

противобактериальными препаратами. Эффективность действия не зависит от pH в просвете кишечника, от чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Препарат действует исключительно в просвете кишечника, поскольку практически не всасывается из пищеварительного тракта.

Фармакокинетика

Практически не всасывается из ЖКТ. Действует в просвете кишечника.

Показания к применению:

Острая диарея бактериального генеза (при отсутствии подозрений на инвазию).

Относится к болезням:

- [Диарея](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к производным нитрофурана.

Не применять у новорожденных (возраст до 1 месяца) и недоношенных детей.

Способ применения и дозы:

Взрослым - по 200 мг 4 раза/сут. Детям в возрасте от 1 месяца до 2.5 лет - по 100 мг 2-3 раза/сут; старше 2.5 лет - по 200 мг 3 раза/сут. Продолжительность курса лечения - не более 7 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Признаки передозировки у людей неизвестны. В случае передозировки рекомендуется промывание желудка и симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение нифуроксазида при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Одновременный прием этанола может вызывать симптомы гиперчувствительности.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Боли в мышцах
- Гематомы подкожные
- Инородные тела
- Кровотечения

Нифуроксазид (суспензия)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: http://drugs.thead.ru/Nifuroksazid_suspenziya