

Нигепан (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

[Нигепан \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [C05AX03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гепарин натрия](#)
- [Бензокаин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Суппозитории ректальные. По 5 супп. в контурной ячейковой упаковке. 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона.

Состав:

Суппозитории ректальные	1 супп.
<i>действующие вещества:</i>	
гепарин натрия	1000 МЕ
(8,3 мг при активности гепарина натрия 120 МЕ/мг)	
бензокаин	50 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> вода — 19,5 мг; жир твердый (Витепсол марки Н15, W35 в соотношении 1:1;	

Нигепан (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Суппосир марки NA15, NAS50 в соотношении 1:1) — до получения суппозитория массой 1,25 г; моноглицериды дистиллированные (Палсгаард 0093) — до 5% к количеству жира твердого	
---	--

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, антикоагулянтное, местноанестезирующее.

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает антитромботическое, противовоспалительное и анальгезирующее действие. Гепарин - антикоагулянт прямого действия. При местном применении гепарин препятствует образованию тромбов, обладает противовоспалительным действием, способствует регенерации соединительной ткани.

Бензокаин является местным анестетиком.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Нигепан не предоставлены.

Показания к применению:

— тромбоз наружных и внутренних геморроидальных узлов.

Относится к болезням:

- [Геморрой](#)
- [Тромбоз](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают ректально по 1 суппозиторию 2 раза/сут. Курс лечения составляет 10-14 дней.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Нигепан не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Диагнозы

- Абсцесс прямой кишки
- Анальная трещина
- Полипы прямой кишки

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Нигепан не описано.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, прохладном, защищенном от света, недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Nigepan_svechi