# Нигепан (свечи)




## Код АТХ:

- C05AX03

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гепарин натрия
- Бензокаин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

*Суппозитории ректальные.* По 5 супп. в контурной ячейковой упаковке. 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона.

## Состав:

| | |
|---|---|
| Суппозитории ректальные | 1 супп. |
| *действующие вещества:* | |
| гепарин натрия | 1000 МЕ |
| (8,3 мг при активности гепарина натрия 120 МЕ/мг) | |
| бензокаин | 50 мг |
| *вспомогательные вещества:* вода — 19,5 мг; жир твердый (Витепсол марки Н15, W35 в соотношении 1:1; | |

| | |
|---|---|
| Суппосир марки NA15, NAS50 в соотношении 1:1) — до получения суппозитория массой 1,25 г; моноглицериды дистиллированные (Палсгаард 0093) — до 5% к количеству жира твердого | |

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, антикоагулянтное, местноанестезирующее.

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат, оказывает антитромботическое, противовоспалительное и анальгезирующее действие. Гепарин - антикоагулянт прямого действия. При местном применении гепарин препятствует образованию тромбов, обладает противовоспалительным действием, способствует регенерации соединительной ткани.

Бензокаин является местным анестетиком.

***Фармакокинетика***

Данные о фармакокинетике препарата Нигепан не предоставлены.

## Показания к применению:

— тромбоз наружных и внутренних геморроидальных узлов.

## Относится к болезням:

- Геморрой
- Тромбоз

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Назначают ректально по 1 суппозиторию 2 раза/сут. Курс лечения составляет 10-14 дней.

## Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции.

## Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Нигепан не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Диагнозы

- Абсцесс прямой кишки
- Анальная трещина
- Полипы прямой кишки

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Нигепан не описано.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, прохладном, защищенном от света, недоступном для детей месте.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Nigepan_svechi