

[Нихлоргин](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковое средство. При концентрации раствора 0.0001% подавляет рост *Microsporum canis*, *Trichophyton gypseum*; при концентрации 0.0007% подавляет рост *Candida albicans*; при повышении содержания активного вещества до 0.003% проявляет фунгицидное действие. При более высокой концентрации оказывает антибактериальное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Показания к применению:

Грибковые поражения кожи: руброфития, паховая эпидермофития, микозы стоп, трихофития, микроспория, кандидоз кожи.

Относится к болезням:

- [Кандидоз кожи](#)
- [Поражения кожи](#)
- [Эпидермофития](#)

Противопоказания:

Беременность, период лактации, повышенная чувствительность к активному веществу.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно. Наносят на пораженные участки кожи 2-3 раза/сут. Лечение продолжают до исчезновения клинических проявлений заболевания. Для предупреждения рецидива продолжают применять 1-2 раза/сут еще в течение 4-6 нед.

Побочное действие:

Возможно: местнораздражающее действие, фотодерматоз, аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

В случае выраженного раздражающего действия при ежедневном применении можно использовать раствор, разбавленный водой 1:1. Участки кожи, обработанные препаратом, не следует подвергать воздействию солнечных лучей.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Nihlorgin>