Никофлекс



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь***	**50 г**
капсаицин	7.5 мг
гидроксиэтил салицилат	4.5 г
этил никотинат	1 г

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает местнораздражающий, обезболивающий и рассасывающий эффект. Содержит вещества, которые вызывают длительное расширение поверхностных сосудов в месте нанесения, повышают температуру кожи и вызывают ощущение тепла.

Действие связано с раздражающим и отвлекающим эффектами капсаицина, анальгезирующей и противовоспалительной активностью гликоль-салицилата (международное непатентованное наименование, рекомендованное Ph.Eur. - гидроксиэтил салицилат *(прим. Vidal)*), рассасывающей способностью этил никотината.

Показания к применению:

— ушибы;

— растяжения связок;

— артроз;

— миалгия;

— невралгия;

— хронический неврит;

— полиартрит (хронический и подострый);

— ишиас;

— тендовагинит (в фазе неполной ремиссии);

— для разогревания мышц до и после занятий спортом.

Относится к болезням:

- Артрит
- Артроз
- Ишиас
- Миалгия
- Невралгия
- Неврит
- Полиартрит
- Тендовагинит
- Ушиб
- Ушибы

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— нарушение целостности кожных покровов;

— детский возраст (до 6 лет);

— берменность;

— период лактации (грудное вскармливание).

С осторожностью: "аспириновая" бронхиальная астма, детский возраст (6-12 лет).

Способ применения и дозы:

Наружно. Поверхность кожи предварительно вымыть теплой водой с мылом, вытереть насухо, а затем нанести на нее тонкий слой мази. Наносится на неповрежденные участки кожи. Применяют 1-2 раза/сут.

При *заболеваниях суставов* - 1 раз/сут. в течение 3 дней, затем - 2 раза/сут. (утром и вечером).

Для *разогревания мышц у спортсменов* во время массажа - полоску мази длиной 3-5 см тщательно втирают в кожу.

Побочное действие:

Кожные аллергические реакции, раздражение в месте нанесения.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает всасывание других лекарственных средств для наружного применения при одновременном применении (вследствие рефлекторного усиления кровотока).

Особые указания и меры предосторожности:

После втирания мази необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Не применять с согревающими компрессами.

В случае появления раздражения кожи рекомендуется отменить препарат.

Избегать попадания на слизистые оболочки (в т.ч. глаз), участки раздражения кожи.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 6 лет.

С осторожностью: детский возраст (6-12 лет).

Источник: http://drugs.thead.ru/Nikofleks