

## Нистатин (свечи)



### Код АТХ:

- [G01AA01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нистатин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки, покрытые оболочкой** светло-желтого цвета, с зеленоватым оттенком, с легким запахом ванилина; на поперечном разрезе видны два слоя.

	<b>1 таб.</b>
нистатин	250 000 ЕД
"_	500 000 ЕД

**Вспомогательные вещества:** лактоза, магния карбонат основной, ОПМЦ, кальция стеарат, крахмал картофельный, МЦ-16, титана диоксид пигментный, твин-80, тропеолин О, масло вазелиновое, ванилин.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные.  
20 шт. - банки стеклянные.  
20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

**Мазь** желтого или буровато-желтого цвета.

	<b>1 г</b>
нистатин	100 000 ЕД

**Вспомогательные вещества:** ланолин безводный, вазелин медицинский.

30 г - тубы алюминиевые.

**Суппозитории вагинальные** желтого цвета, торпедообразной формы.

	<b>1 супп.</b>
нистатин	250 000 ЕД
"_	500 000 ЕД

**Вспомогательные вещества:** пропиловый эфир параоксибензойной кислоты, лимонная кислота пищевая, витепсол Н-15, витепсол W-35.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

**Суппозитории ректальные** желтого цвета, торпедообразной формы.

	<b>1 супп.</b>
нистатин	250 000 ЕД
"_	500 000 ЕД

## Нистатин (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

*Вспомогательные вещества:* пропиловый эфир параоксибензойной кислоты, лимонная кислота пищевая, масло вазелиновое, витепсол Н-15, витепсол W-35.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противогрибковый препарат из группы полиенов. Связываясь со стеролами в клеточной мембране грибов, нарушает ее проницаемость, что приводит к выходу основных компонентов клетки. Оказывает фунгистатическое действие.

Активен в отношении дрожжеподобных грибов рода *Candida*.

#### Фармакокинетика

##### *Всасывание и распределение*

После приема внутрь нистатин плохо всасывается из ЖКТ. При местном применении не всасывается в системный кровоток. Не кумулирует.

##### *Выведение*

Выводится из организма с калом.

### Показания к применению:

#### *Для таблеток и мази*

—кандидоз кожи и слизистых оболочек;

—кандидоз внутренних органов;

—профилактика кандидоза при длительной терапии противомикробными препаратами, особенно у истощенных и ослабленных пациентов.

#### *Для суппозиториев вагинальных*

—вагинальный кандидоз;

—профилактика грибковых осложнений при местной противомикробной терапии.

#### *Для суппозиториев ректальных*

—кандидоз нижних отделов кишечника;

—профилактика грибковых поражений в до- и послеоперационные периоды.

### Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Кандидоз кожи](#)

### Противопоказания:

—нарушения функции печени;

—панкреатит;

—язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

—беременность;

—повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

При *лечении кандидоза внутренних органов* Нистатин назначают внутрь независимо от приема пищи.

**Взрослым** назначают по 500 000 ЕД 4-8 раз/сут.

При *генерализованном кандидозе* назначают до 6 000 000 ЕД/сут.

**Детям в возрасте 1-3 лет** назначают по 250 000 ЕД 3-4 раза/сут, **в возрасте старше 3 лет** - по 250 000-500 000 ЕД 4 раза/сут. Продолжительность лечения - 10-14 дней. При необходимости курс лечения повторяют через неделю.

При *лечении кандидоза кожи и слизистых оболочек* мазь наносят тонким слоем на пораженные участки 2 раза/сут, ежедневно в течение 7-10 дней. Применение мази можно сочетать с приемом Нистатина внутрь.

Суппозитории вагинальные вводят во влагалище после гигиенических процедур по 1 суппозиторию 2 раза/сут (утром и вечером). Курс лечения - 10-14 дней.

Суппозитории ректальные вводят глубоко в прямую кишку по 1 суппозиторию 2 раза/сут (утром и вечером). Курс лечения - 10-14 дней.

При необходимости проводят повторные курсы лечения.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* при приеме препарата внутрь и применении суппозитория ректальных возможны тошнота, рвота, диарея.

*Аллергические реакции:* кожный зуд, озноб, повышение температуры.

*Прочие:* возможен риск распространения резистентных форм грибов, что требует отмены препарата.

## Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Нистатин не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Нистатин противопоказан к применению при беременности.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении нистатина и клотримазола активность последнего снижается.

## Особые указания и меры предосторожности:

При развитии побочных реакций следует уменьшить дозу или отменить препарат.

При менструации не следует прерывать лечение суппозиториями вагинальными. При грибковых заболеваниях влагалища рекомендуется одновременное лечение полового партнера. В период лечения следует избегать половых контактов.

### **При нарушениях функции печени**

Противопоказан при нарушениях функции печени.

### **Применение в детском возрасте**

## **Нистатин (свечи)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Детям в возрасте 1-3 лет** назначают по 250 000 ЕД 3-4 раза/сут, **в возрасте старше 3 лет** - по 250 000-500 000 ЕД 4 раза/сут. Продолжительность лечения - 10-14 дней. При необходимости курс лечения повторяют через неделю.

### **Условия хранения:**

Список Б. Препарат в форме таблеток следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре 18°-20°С.

Препарат в форме мази, суппозиториев вагинальных и суппозиториев ректальных следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 5°С.

Срок годности препарата в форме таблеток, суппозиториев вагинальных, суппозиториев ректальных - 2 года, срок годности препарата в форме мази - 3 года.

*Условия отпуска из аптек*

Препарат отпускается по рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Nistatin\\_svechi](http://drugs.thead.ru/Nistatin_svechi)