Нитрофунгин



Код АТХ:

- D01AE

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Хлорнитрофенол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для наружного применения 1%*** прозрачный, от желтого до зелено-желтого цвета, с запахом этанола.

	1 мл	**1 фл.**
2-хлор-4-нитрофенол	10 мг	250 мг

Вспомогательные вещества: этанол 96% - 11.2 г, триэтиленгликоль - 2.5 г, вода очищенная - до 25 мл.

25 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковое средство. При концентрации раствора 0.0001% подавляет рост Microsporum canis, Trichophyton gypseum; при концентрации 0.0007% подавляет рост Candida albicans; при повышении содержания активного вещества до 0.003% проявляет фунгицидное действие.

При более высокой концентрации оказывает антибактериальное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Показания к применению:

Грибковые поражения кожи:

— руброфития;

— паховая эпидермофития;

— трихофития;

— кандидоз кожи;

— микозы стоп;

— грибковые заболевания наружного слухового прохода.

Относится к болезням:

- Грибковые заболевания
- Кандидоз кожи
- Поражения кожи
- Эпидермофития

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. Раствор наносят на пораженные участки кожи ватным тампоном 2-3 раза/сут. Лечение продолжают до исчезновения клинических проявлений заболевания.

Для *предупреждения рецидива* раствор продолжают применять 2-3 раза в неделю в течение 4-6 недель.

С *целью профилактики* раствор применяют 1-2 раза в неделю в течение 4 недель.

Побочное действие:

Местнораздражающее действие, фотодерматит, аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности возможно только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода.

В период лактации необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Неизвестно.

Особые указания и меры предосторожности:

В случае выраженного раздражающего действия при ежедневном применении можно использовать раствор разбавленный водой (1:1).

Участки кожи, обработанные препаратом, не следует подвергать воздействию солнечных лучей.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 10°С до 25°С, в защищенном от света, недоступном для детей месте. Не использовать после истечения срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Nitrofungin