

## Низорал (шампунь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

## [Низорал \(шампунь\)](#)



### Код АТХ:

- [J02AB02](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Кетоконазол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Шампунь 2%** в виде красно-оранжевой жидкости.

	<b>1 г</b>
кетоконазол	20 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия лаурилсульфат - 380 мг, динатрия лаурилсульфосукцинат - 150 мг, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла - 20 мг, коллагена гидролизат - 10 мг, макрогола метилдекстрозы диолеат - 10 мг, натрия хлорид - 5 мг, хлористоводородная кислота - 4 мг, имидомочевина - 2 мг, ароматизатор - 2 мг, натрия гидроксид - 1 мг, краситель "красный очаровательный" (E129) - 30 мкг, вода - до 1 г.

25 мл - флаконы из полиэтилена высокой плотности с навинчивающейся крышкой (1) - пачки картонные.

60 мл - флаконы из полиэтилена высокой плотности с навинчивающейся крышкой (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

## Низорал (шампунь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Кетоконазол, синтетическое производное имидазол-диоксолана, обладает противогрибковым действием в отношении дерматофитов, таких как *Trichophyton* spp., *Epidermophyton* spp., *Microsporum* spp., и дрожжей, таких как *Candida* spp., и *Malassezia* spp. (*Pityrosporum* spp.).

Низорал шампунь 2% быстро уменьшает шелушение и зуд, которые обычно сопутствуют себорейному дерматиту, перхоти, отрубевидному лишая.

### Фармакокинетика

Концентрации кетоконазола не определяются в плазме крови после местного нанесения Низорал шампуня 2% на волосистую часть кожи головы, однако определяются после местного нанесения шампуня на все тело в концентрации 11.2 нг/мл - 33.3 нг/мл. Маловероятно, что такие концентрации могут вызвать какие-либо лекарственные взаимодействия, однако возможно усиление аллергических реакций.

## Показания к применению:

— лечение и профилактика инфекций, вызванных дрожжами *Malassezia* spp. (*Pityrosporum* spp.), таких как отрубевидный лишай (локальный), себорейный дерматит и перхоть.

## Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Инфекции](#)
- [Лишай](#)
- [Отрубевидный лишай](#)
- [Себорея](#)

## Противопоказания:

— известная повышенная чувствительность к любому из компонентов шампуня.

## Способ применения и дозы:

**Дети с младенческого возраста, подростки и взрослые:** на пораженные участки нанести Низорал шампунь 2% на 3-5 мин, затем промыть водой.

Лечение:

— *отрубевидный лишай*: 1 раз в день в течение 5 дней;

— *себорейный дерматит и перхоть*: 2 раза в неделю в течение 2-4 недель.

Профилактика:

— *отрубевидный лишай*: 1 раз в день в течение 3 дней (разовый курс лечения перед наступлением лета);

— *себорейный дерматит и перхоть*: еженедельно или 1 раз в 2 недели.

Особенностей применения у детей не имеется.

## Побочное действие:

### По данным клинических исследований

Нежелательных реакций, наблюдавшихся у  $\geq 1\%$  пациентов после нанесения Низорал шампунь 2% на волосистую часть головы или кожу, не выявлено.

Нежелательные реакции, наблюдавшиеся у  $\leq 1\%$  пациентов, наносивших Низорал шампунь 2% на волосистую часть головы или кожу, приведены ниже.

*Со стороны органа зрения*: раздражение глаз, повышенное слезотечение.

*Системные нарушения и осложнения в месте введения*: эритема в месте нанесения, раздражение в месте нанесения,

## Низорал (шампунь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

гиперчувствительность, кожный зуд, пустулы, кожные реакции.

*Со стороны иммунной системы:* гиперчувствительность.

*Инфекции и инвазии:* фолликулит.

*Со стороны нервной системы:* нарушение вкусовой чувствительности.

*Со стороны кожи и подкожной клетчатки:* угревая сыпь, алопеция, контактный дерматит, сухость кожи, нарушение текстуры волос, ощущение жжения, кожная сыпь, шелушение кожи.

### **По данным постмаркетинговых исследований**

Нежелательные эффекты перечислены ниже в соответствии со следующей классификацией: очень часто ( $\geq 1/10$ ), часто ( $\geq 1/100$ , но  $< 1/10$ ), нечасто ( $\geq 1/1000$ , но  $< 1/100$ ), редко ( $\geq 1/10000$ , но  $< 1/1000$ ), очень редко ( $< 1/10\ 000$ , включая единичные сообщения).

*Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки:* очень редко - отек, крапивница, изменение цвета волос.

## **Передозировка:**

При использовании Низорал шампуня 2% развития передозировки не предполагается, т.к. препарат предназначен только для наружного применения.

При случайном приеме внутрь следует назначить симптоматическую и поддерживающую терапию. Для предотвращения аспирации запрещается вызывать рвоту или использовать промывание желудка.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Контролируемых исследований у беременных и кормящих женщин не проводилось. Нет данных о том, что препарат Низорал шампунь 2% может быть опасен при применении у беременных и кормящих женщин.

При беременности и в период лактации применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Данные по взаимодействию с другими лекарственными средствами отсутствуют.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При использовании шампуня следует избегать попадания его в глаза. При попадании шампуня в глаза необходимо промыть их водой.

Для предотвращения синдрома отмены при длительном местном лечении кортикостероидами рекомендуется продолжать местное применение кортикостероидов в сочетании с Низорал шампунем 2% с последующей постепенной отменой кортикостероидов в течение 2-3 недель.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Низорал шампунь 2% не оказывает воздействия на способность управлять автомобилем и работать с техникой.

*Правила утилизации препарата*

Пациент должен быть информирован о том, что если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности, то не следует выбрасывать его в сточные воды или на улицу. Необходимо поместить лекарственное средство в пакет и положить в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

### **Применение в детском возрасте**

Особенностей применения у детей не имеется, используется у детей с младенческого возраста.

## **Низорал (шампунь)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Nizoral\\_shampun](http://drugs.thead.ru/Nizoral_shampun)