Нобен



Код АТХ:

- N06BX13

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Идебенон

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капсулы желтого цвета, размер №1; содержимое капсул - гранулят, содержащий гранулы и порошок желтого или желто-оранжевого цвета с оранжевыми и белыми вкраплениями.

	1 капс.
идебенон	30 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал картофельный, повидон низкомолекулярный, магния стеарат.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Ноотропный препарат. Улучшает обменные процессы в головном мозге путем активации синтеза глюкозы и АТФ,

улучшения кровоснабжения и оксигенации тканей мозга, способствует выведению лактатов. Обладает антиоксидантными свойствами, замедляет перекисное окисление липидов и тем самым предохраняет мембраны нейронов и митохондрий от повреждений.

Обладает также психостимулирующим эффектом и нейропротекторными свойствами. С первых дней приема препарата проявляется антиастеническое, психостимулирующее и антидепрессивное действие. Ноотропное действие проявляется, как правило, после 20-25 дней терапии.

Фармакокинетика

Всасывание

После приема препарата внутрь идебенон быстро абсорбируется из ЖКТ, C_{max} в плазме крови наблюдается через 4 ч после приема.

Распределение

Проникает через ГЭБ в значительных количествах и распределяется в тканях мозга. Не кумулирует даже при длительном применении.

Выведение

Выводится преимущественно почками.

Показания к применению:

— психоорганический синдром, обусловленный нарушениями мозгового кровообращения и возрастными инволюционными изменениями головного мозга;

— цереброастенические расстройства сосудистой, травматической, психогенной (неврастения) и сочетанной этиологии, проявляющиеся в форме нарушений памяти и/или внимания, снижения интеллектуальной продуктивности и общей активности, эмоциональной неустойчивости, астенических, астено-депрессивных и умеренно выраженных депрессивных состояний, головной боли, головокружений, шума в ушах.

Относится к болезням:

- Астения
- Головокружение
- Депрессия
- Нарушение памяти
- Неврит
- Психоорганический синдром
- Травмы

Противопоказания:

— хроническая почечная недостаточность;

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Рекомендуемая доза составляет 30 мг (1 капсула) 2-3 раза/сут. Длительность курса лечения - 1.5-2 мес; в зависимости от выраженности симптомов курсы повторяют 2-3 раза в год.

Капсулы принимают после еды, последний прием - до 17 ч.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС: нарушение засыпания, психическое возбуждение, головная боль.

Прочие: аллергические реакции, диспепсия.

Передозировка:

Симптомы: усиление выраженности побочных эффектов.

Лечение: промывание желудка, прием активированного угля; при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью применяют препарат при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Нобен не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нельзя принимать во время работы водителям транспорта и другим лицам, профессия которых требует быстрой психической и двигательной реакции.

При нарушениях функции почек

Противопоказано применение препарата при хронической почечной недостаточности.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Noben