Нокспрей

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Оксиметазолин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Спрей назальный*** в виде бесцветной или слегка желтоватой, прозрачной жидкости со специфическим запахом.

	1 мл
оксиметазолина гидрохлорид	500 мкг

Вспомогательные вещества: камфора рацемическая 0.15 мг, левоментол 0.25 мг, эвкалиптол (цинеол) 0.075 мг, натрия дигидрофосфата моногидрат 2 мг, натрия эдетат (трилон Б) 0.1 мг, бензалкония хлорид 0.2 мг, пропиленгликоль 100 мг, 0.1 М р-р натрия гидроксида или хлористоводородной кислоты до pH 4.5, вода очищенная до 1 мл.

20 мл - флаконы полимерные (1) с пробками-распылителями и крышками с контролем первого вскрытия - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Нокспрей - α-адреномиметик, производное имидазолина, относится к сосудосуживающим средствам для местного применения.

При попадании в полость носа препарат суживает артериолы слизистой оболочки полости носа, вследствие чего уменьшается отек, гиперемия, экссудация, восстанавливается носовое дыхание, уменьшаются выделения из носа.

Нокспрей уменьшает также отечность слизистой оболочки вокруг отверстия евстахиевой трубы, улучшая дренаж при евстахиите и среднем отите.

Эфирные масла, входящие в состав препарата, способствуют устранению раздражения слизистой оболочки носа, защищают ее от чрезмерного высыхания.

Фармакокинетика

Локальное сужение сосудов слизистой оболочки носа и придаточных пазух возникает через 5-10 мин после впрыскивания Нокспрея в полость носа и длится до 10-12 ч.

Показания к применению:

— острый ринит аллергической или инфекционно-воспалительной этиологии;

— синуситы;

— заложенность носа и затрудненное носовое дыхание при простудных заболеваниях;

— евстахиит, средний отит;

— для облегчения проведения риноскопии и других манипуляций в носовой полости.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Евстахиит
- Инфекции
- Отит
- Ринит
- Синусит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— атрофический ринит;

— детский возраст до 6 лет;

— беременность;

— период лактации.

С осторожностью применяют препарат при хронической сердечной недостаточности, аритмии, выраженном атеросклерозе, артериальной гипертензии, тиреотоксикозе, сахарном диабете, хронической почечной недостаточности, закрытоугольной глаукоме, гиперплазии предстательной железы с клиническими симптомами; при одновременном приеме ингибиторов МАО, трициклических антидепрессантов.

Для предупреждения распространения инфекции не следует использовать один флакон нескольким лицам. Следует избегать длительного применения и передозировки препарата. Длительное применение противоотечных средств может приводить к снижению их эффективности. Злоупотребление этими средствами может вызывать атрофию слизистой оболочки полости носа и реактивную гиперемию с медикаментозным ринитом.

Способ применения и дозы:

Кончик насадки флакона вводят в каждый носовой ход и резко нажимают один раз на флакон. Во время впрыскивания воздух втягивается носом. Не следует отклонять назад голову и переворачивать флакон при впрыскивании Нокспрея.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет применяют по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2 раза /сут, **детям старше 12 лет и взрослым** - по 1-2 впрыскивания в каждый носовой ход 2 раза/сут.

Длительность применения не должна превышать 7 сут.

Побочное действие:

Иногда: ощущение жжения или сухости носовых оболочек, чиханье.

В редких случаях: реактивная гиперемия.

Многократная передозировка при местном назальном применении приводит к таким системным симпатомиметическим эффектам, как тахикардия, бессонница, беспокойство, повышение АД, головная боль, тошнота.

Крайне редко при применении Нокспрея возможно развитие тяжелых реакций гиперчувствительности (в т.ч. отек Квинке).

В случае возникновения побочных эффектов применение препарата необходимо прекратить и обратиться к врачу.

Передозировка:

При значительной передозировке или при случайном применении внутрь могут отмечаться такие *симптомы:* миоз, тошнота, рвота, цианоз, гипертермия, тахикардия, аритмия, сосудистая недостаточность, артериальная гипертензия, дыхательные расстройства, отек легких, остановка сердца, психические расстройства. Крайне редко - угнетение функций ЦНС с возможным развитием комы.

Лечение: при передозировке препарата промывают желудок и проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и грудного вскармливания препарат применяют в случае крайней необходимости, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нокспрей не следует одновременно применять с другими местными сосудосуживающими средствами и средствами для интраназального введения, а также с трициклическими антидепрессантами и ингибиторами МАО.

Особые указания и меры предосторожности:

Использование в педиатрии

Нокспрей применяют у детей от 6 лет.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В рекомендованных дозах препарат не влияет на скорость психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

С осторожностью применяют при хронической почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Нокспрей применяют у детей старше 6 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С**.** Срок годности **-** 3 года. Не использовать препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Noksprey