

## Ноохолин Ромфарм



### Код АТХ:

- [N07AX02](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Холина альфосцерат](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Раствор для в/в и в/м введения** прозрачный, бесцветный или светло-желтого цвета.

	<b>1 мл</b>	<b>1 амп.</b>
холина альфосцерат	250 мг	1 г

*Вспомогательные вещества:* вода д/и - до 1 мл.

4 мл - ампулы (3) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

4 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Ноотропный препарат, холиномиметик центрального действия с преимущественным влиянием на ЦНС. Препарат содержит 40.5% метаболически защищенного холина. Холина альфосцерат в организме под влиянием ферментов головного мозга, расщепляется на холин и глицерофосфат. Холин участвует в синтезе ацетилхолина, передавая нервные импульсы и улучшая работу головного мозга, а глицерофосфат является предшественником фосфатидилхолина мембран нейронов.

Холина альфосцерат улучшает церебральный кровоток, усиливает метаболические процессы в головном мозге, активирует структуры ретикулярной формации головного мозга и восстанавливает сознание при травматическом поражении головного мозга.

Результаты клинических исследований показали, что холина альфосцерат стимулирует дозозависимое выделение ацетилхолина в физиологических условиях нейротрансмиссии.

## **Фармакокинетика**

### *Распределение*

Легко проникает в различные ткани и органы, в т.ч. в головной мозг.

### *Выведение*

Выводится преимущественно легкими в виде диоксида углерода (85%), а также выводится почками и через кишечник (15%).

## **Показания к применению:**

- острый период черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем поражения;
- психоорганический синдром на фоне дегенеративных и инволюционных изменений мозга;
- последствия цереброваскулярной недостаточности (нарушения мыслительной функции);
- мультиинфарктная деменция.

## **Относится к болезням:**

- [Деменция](#)
- [Психоорганический синдром](#)
- [Травмы](#)
- [Цереброваскулярная недостаточность](#)
- [Черепно-мозговая травма](#)

## **Противопоказания:**

- геморрагический инсульт (острая стадия);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Препарат вводят в/м и в/в (медленно) по 1 г/сут в течение 15-20 дней. Затем переходят на прием холина альфосцерата перорально.

## **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* запор, диарея, сухость слизистой оболочки полости рта, фарингит.

*Со стороны нервной системы:* головная боль, сонливость, бессонница, агрессивность, тревога, нервозность, ишемия головного мозга, головокружение.

*Со стороны кожных покровов:* сыпь, крапивница.

*Прочие:* боль в месте введения, учащение мочеиспускания.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* в случае передозировки отмечается тошнота, которая проходит после уменьшения дозы или прекращения лечения.

*Лечение:* проведение симптоматической терапии.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата при беременности и период лактации противопоказано.

На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Препарат не обладает тератогенным и мутагенным действием.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Клинически значимого лекарственного взаимодействия холина альфосцерата с другими лекарственными препаратами не выявлено.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При возникновении тошноты следует уменьшить дозу препарата Ноохолин Ромфарм.

*Использование в педиатрии*

**Детям и подросткам младше 18 лет** препарат следует назначать только после предварительной оценки общего состояния здоровья.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Ноохолин Ромфарм не оказывает влияния на быстроту психомоторных реакций.

**Применение в детском возрасте**

**Детям и подросткам младше 18 лет** препарат следует назначать только после предварительной оценки общего состояния здоровья.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

4 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Nooholin\\_Romfarm](http://drugs.thead.ru/Nooholin_Romfarm)